

**Quienes deseen inocularse pueden acudir a los vacunatorios públicos y privados en convenio.**

EQUIPO EL OVALLINO  
Ovalle

Ante la confirmación de un caso de sarampión, en la provincia de Salta en Argentina, la autoridad sanitaria realizó un llamado a la vacunación, especialmente a quienes viajan fuera del país durante estas vacaciones.

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa. Se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Puede provocar una enfermedad grave, complicaciones o la muerte. Por cada persona enferma puede contagiar entre 16 a 18 más.

Por esto, a raíz de la confirmación el 16 de enero de un caso de sarampión en Argentina, de una menor de 19 meses de edad, la seremi de Salud Coquimbo recordó la importancia de la vacunación en la prevención de esta enfermedad.

“La vacunación sigue siendo la medida más efectiva para no desarrollar la enfermedad, por lo que es indispensable que los grupos objetivos que se encuentran en el Programa Nacional de Inmunizaciones se vacunen, es decir niños de 12 meses (primera dosis) y 36 meses (segunda dosis de refuerzo) los cuales pueden acceder a través de los vacunatorios de la red pública de salud y privados en convenio”, señaló la seremi de Salud, Paola Salas.

Además, en el caso de los viajeros, la autoridad de salud señaló que “se refuerza la vacunación con una dosis de vacuna contra el sarampión, al menos

TRAS REGISTRARSE UN BROTE EN ARGENTINA

# Refuerzan la vacunación de viajeros **contra el sarampión**



*El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, especialmente en niños y personas no inoculadas.*  
LALITARO CARMONA

15 días antes del viaje al extranjero en los siguientes grupos: lactantes entre 6 a 11 meses y 29 días, y en niños a partir de los 12 meses que cuenten sólo con una dosis. También, se encuentra vigente la estrategia de puesta al día para las personas nacidas entre años 1971 y 1981, que no cuenten con un registro válido de dos dosis de vacuna”, sostuvo.

## EL SARAMPIÓN

En 1993 Chile interrumpió la transmisión autóctona de la enfermedad, gracias al esfuerzo de los equipos

técnicos quienes han replicado campañas de vacunación cada 5 años en población susceptible, logrando mantener una alta cobertura de vacunación de acuerdo a recomendaciones de OMS prepandemia.

El sarampión puede afectar a cualquier persona, siendo más común entre los niños. Sin embargo, en el país, el grupo etareo nacido entre 1971-1981 también son susceptibles de contraer la enfermedad.

Los síntomas del sarampión suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus. Los primeros síntomas suelen durar entre 4 y 7

días, e incluyen fiebre mayor a 38°C, tos, secreción nasal, dolor articular y erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo.

Ningún país escapa al sarampión, entre ellos, Chile, el cual ha reportado casos esporádicos durante la última década, principalmente en población migrante de otros países de las Américas donde nuevamente el sarampión se ha transformado en una enfermedad endémica, en población susceptible no vacunada (nacido entre 1971-1981), y en viajeros provenientes de zonas donde hay brotes activos de sarampión.