

Según nuevo estudio con proyecciones

Recortes en ayuda internacional pueden significar millones de casos y muertes por VIH

Las nuevas infecciones por VIH se contarían por millones y las muertes también. Ese podría ser el impacto potencial de una reducción significativa de la financiación internacional de los programas de prevención y tratamiento de la enfermedad, que podría volver a niveles no vistos desde comienzos de los años 2000.

De aquí a 2030, si no se mitigan los recortes propuestos por los principales países donantes, podrían darse entre 4,4 y 10,8

millones de nuevas infecciones adicionales en los países de renta baja y media, así como entre 770.000 y 2,9 millones de muertes relacionadas con el VIH en niños y adultos, señala un estudio basado en modelos que publica The Lancet VIH.

Más del 90% del financiamiento internacional contra el VIH procede de Estados Unidos (73%); Reino Unido (9%); Francia (4%); Alemania (3%), y los Países Bajos (2%).

Esos países anunciaron recién

temente planes para aplicar recortes significativos a la ayuda exterior, lo que conducirá a una reducción prevista del 24% en el financiamiento internacional mundial contra el VIH para 2026, indica el estudio.

Además, el Gobierno de EE.UU. puso en pausa todo el financiamiento de la ayuda exterior (con excepciones limitadas) en enero pasado por 90 días.

Desde 2015, los donantes internacionales han contribuido aproximadamente al 40% de recursos para el VIH en los países de ingreso bajo y medio, lo que hace que su apoyo sea crucial para los esfuerzos mundiales de tratamiento y prevención.

Los modelos usados en el estudio sugieren que los recortes "podrían dar al traste con décadas de progresos realizados para acabar con el VIH/SIDA como amenaza para la salud pública, y las nuevas infecciones y muertes podrían volver a niveles no vistos desde principios de la década de 2000".

Incluso si se restableciera el apoyo al tratamiento del VIH tras 12 a 24 meses, el número de nuevas infecciones podría estabilizarse en niveles de 2020, lo que sigue siendo un retroceso.



Realizarse el examen es una de las formas de prevenir contagios.