



ISP: fármaco contra la calvicie provocaría “ideación suicida”

La finasterida podría ocasionar también depresión y disfunción eréctil, ante lo cual el organismo pidió “vigilar cambios de ánimo o problemas sexuales”.

Matías Gatica Lindsay
Medios Regionales

El Instituto de Salud Pública dio a conocer ayer un informe para advertir de los posibles efectos adversos del fármaco finasterida oral de 1 y 5 miligramos, el que se usa en el país para tratar la alopecia androgénica.

Según detalló el ISP, entre los efectos indeseados de la finasterida se encontraría la ideación suicida. “Asimismo, se ha vinculado con depresión y disfunción sexual, esta última posible factor contribuyente. Otras agencias regulatorias, como la PMDA de Japón y la MHRA del Reino Unido, han emitido advertencias en la misma línea”.

El documento se basa en un informe de las Agencia Europea de Medicamentos, que a través de su comité de seguridad (PRAC) aseguró que “aunque no existen pruebas concluyentes, el PRAC determinó incluir una advertencia sobre riesgo potencial de alteraciones del estado de ánimo como medida de precaución”.



REFERENCIAL
EL MEDICAMENTO SE USA EN EL TRATAMIENTO DE LA ALOPECIA LA HIPERLASIA PROSTÁTICA BENIGNA.

“Desde el año 2019, por instrucción del Instituto de Salud Pública, los productos farmacéuticos que contienen finasterida en su formulación incorporaron, en sus folletos de información, como advertencia, la posibilidad de presentar alteraciones del estado de ánimo y depresión, producto de su uso”, aseguró el ISP.

Tal instituto notificó esta semana que “en Chile, entre 2020 y julio de 2025, se registraron dos notificaciones de

sospechas de reacciones adversas con finasterida (ninguna psiquiátrica) y 28 con dutasterida en combinación con tamsulosina (dos por disfunción eréctil)”.

Ante ello el ISP determinó actualizar los folletos de información de este fármaco, tanto para el paciente como para el médico. Además, el organismo recomendó a los profesionales de la salud y pacientes “vigilar cualquier cambio en el estado de ánimo o problemas sexuales

y notificarlos en caso de cualquier sospecha de reacción adversa” para reevaluar el tratamiento.

Además de en la calvicie, la finasterida, que pertenece a un grupo de medicamentos llamados inhibidores de la 5-alfa reductasa, se usa en dosis de 5 mg para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna (HPB), también conocida como agrandamiento de próstata, condición que provoca problemas urinarios. ☼