

Seremi de Salud de Valparaíso llamó a completar vacunación en niños por sarampión

Acción preventiva es parte del Programa Nacional de Inmunizaciones y contempla dos dosis, a los 12 y a los 36 meses de edad. En la región de Valparaíso, durante 2025 se administraron más de 30 mil vacunas.

Ante la confirmación de un caso importado de Sarampión en Chile en un lactante de 11 meses con antecedentes de viaje reciente a México, país que presenta brotes de sarampión; y sin registro de vacunación recomendada para viajeros desde los seis meses; el seremi de Salud (s) de Valparaíso, Carlos Zamora Rojas, reforzó el

llamado a madres, padres y cuidadores a iniciar y completar el esquema de vacunación contra esta enfermedad en niños.

La vacuna contra el sarampión, rubéola y parotiditis (SRP) es parte del Programa Nacional de Inmunizaciones, es gratuita, obligatoria para niños y niñas a los 12 (primera dosis) y 36 meses (segunda dosis) de

edad; y está disponible en vacunatorios públicos y en convenios con la Seremi de Salud. En la región de Valparaíso, durante 2025 se administraron más de 30 mil vacunas, registrando una cobertura de 87,2% en la primera dosis y 66,5% en la segunda.

“Nuestro primer interés como región y como país es poder mantener a los niños y niñas con



su dosis correspondiente de sarampión, tanto la primera como la segunda, y para eso los padres y madres tienen que estar muy atentos a las indicaciones de salud en general, pero también de los profesionales de los establecimientos de salud correspondientes a su sector”, indicó el seremi (s) Carlos Zamora.

ENFERMEDAD CONTAGIOSA

El sarampión es una enfermedad viral contagiosa que afecta principalmente a niños y niñas transmitiéndose por gotitas al toser o estornudar. Con la inmunización se evitan complicaciones graves como neumonías, encefalitis y

cegueras asociadas a este virus.

Por otra parte, está disponible la vacunación para quienes viajan al extranjero, sobre todo a países que mantienen casos activos de la enfermedad. Esta dosis de refuerzo debe ser administrada al menos 15 días antes del viaje.