

El último caso fue el de un menor de 12 años de la provincia del Biobío. En lo que va de esta temporada el Laboratorio del HGGB lleva 34 casos analizados y van al alza por incendios.

Por Estefany Cisternas Bastias
 estefanycisternas@diarielsur.cl

Recientemente el Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó el primer caso de hantavirus en la Provincia del Biobío y el segundo a nivel regional, correspondiente a un menor de 12 años de la comuna de Alto Biobío que falleció debido al contagio. Por lo anterior, la Seremi de Salud del Biobío inició una investigación epidemiológica ambiental para determinar factores que incidieron en el contagio, como los tiempos de exposición, entre otros aspectos.

En lo que va de 2026 ha crecido la sospecha de casos por contacto por el ratón colilargo que transmite el virus, según relataron desde el Hospital Guillermo Grant Benavente (HGGB), recinto que se encarga del diagnóstico junto al ISP.

"La época estival es la época donde hay mayor circulación o posibilidades de circulación de este virus, debido a que la gente concurre más a los lugares rurales que es donde habita el transmisor del virus hanta. Este año llevamos 34 casos analizados, de los cuales hemos tenido un caso positivo que lamentablemente fue derivado al Hospital Las Higuera donde el paciente falleció. Por todo lo que ha ocurrido con los incendios ha habido una mayor consulta, una mayor sospecha. En años habituales, en total, no son más de 70 casos con sospecha", indicó Iván Rodríguez, jefe(s) del Laboratorio Clínico del HGGB.

VIGILANCIA Y DETECCIÓN
 Nayadeth Aptekar, profesional de Vigilancia Epidemiológica de



Seremi de Salud del Biobío está realizando una investigación epidemiológica ambiental para determinar factores de exposición que inciden en el contagio.

Autoridad sanitaria inició investigación tras segundo fallecido

Región registra aumento de sospecha de contagios por hantavirus durante este año

la Seremi de Salud, explicó que cumplen un rol de vigilancia durante todo el año, con mayor énfasis en el periodo estival. Cuando un establecimiento de salud notifica un caso sospechoso, activan de inmediato equipos de Epide-

miología y Zoonosis, quienes realizan una investigación epidemiológica detallada, entrevistando al paciente o a sus familiares para reconstruir los lugares visitados y las actividades realizadas durante el periodo de incubación. "Se desarrollan visitas en terreno a los sitios de posible exposición, como viviendas, sectores rurales, lugares de trabajo o espacios de recreación. En estas inspecciones se evalúan condiciones ambientales de riesgo, como presencia de roedores, acumulación de basura, maleza o deficiencias estructurales", contó Aptekar.

El HGGB apoya en la realiza-

ción de exámenes cuando hay sospecha, con PCR y serología (ELISA), confirmando y descartando casos. Leonila Ferreira, jefa de la UPC Médico Quirúrgico del HGGB señaló que esperan se sumen casos tras el incendio forestal, durante la primera y segunda semana de marzo estarán atentos. "En los casos de fallecimiento lo que falla ahí es la detección de la enfermedad, porque son pacientes que una vez que se establece la fase grave, que se llama síndrome cardiopulmonar que afecta pulmones y corazón, conlleva una alta mortalidad. Hoy día, con los mejores manejos, la mortalidad

está alrededor de un 25% a un 30%", explicó Ferreira.

Si una persona sospecha que ha estado expuesta al virus hanta, ya sea por contacto con roedores colilargo o por haber estado en lugares de riesgo, lo más importante es consultar precozmente en un establecimiento de salud, incluso si los síntomas iniciales son leves. "Se debe estar atento a signos como fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, malestar general o dificultad respiratoria, informando siempre al equipo de salud sobre las actividades realizadas y los lugares visitados en las semanas previas, ya que este antecedente

MEDIDAS PREVENTIVAS

Para evitar contagios en sectores rurales o semirurales, se debe: ventilar por 30 minutos antes de entrar a lugares cerrados; limpiar suelo y superficies con agua y cloro; mantener exterior de recintos libres de malezas y basura; y mantener alimentos y agua fuera del alcance de los roedores. Las personas que van de camping o excursión deben elegir lugares limpios y libres de matorrales; usar carpa con piso, cierre y sin agujeros; guardar alimentos en envases cerrados; caminar sólo por senderos habilitados, y no consumir frutos silvestres.

es fundamental para orientar el diagnóstico. En este contexto, es importante considerar que el periodo de incubación es variable y puede ser difícil de precisar, aunque generalmente fluctúa entre 1 y 3 semanas, con un rango estimado entre 7 y 45 días", agregó Aptekar.

30%

es la mortalidad que actualmente se registra ante un contagio de hantavirus en el Biobío, pese a los tratamientos.

34

casos han sido analizados en el Laboratorio Clínico del HGGB debido a la sospecha de un contagio de hantavirus.