

# Alerta ante nueva sospecha de Virus Hanta en Limache

**Una mujer de 46 años fue trasladada desde Limache al Hospital Biprovincial Quillota-Petorca. La paciente habría estado expuesta a roedores mientras realizaba labores de limpieza en una parcela**

Una mujer de 46 años fue trasladada desde el Hospital Santo Tomás de Limache hasta el Hospital Biprovincial Quillota-Petorca por sospecha de virus Hanta, activándose los protocolos clínicos correspondientes para su evaluación y monitoreo.

Según los antecedentes preliminares, la paciente habría estado realizando labores de limpieza en una parcela en la zona rural de Limache, instancia en la que se encontró con un nido de roedores, situación considerada de riesgo para la eventual exposición al virus.

Desde la autoridad sanitaria se indicó que el caso está en evaluación y que se mantiene bajo observación médica especializada, considerando la evolución que puede presentar esta enfermedad.

El virus Hanta se transmite a través de la inhalación de aerosoles provenientes de orina, heces o saliva de roedores silvestres infectados, principalmente el ratón colilargo (*Oligoryzomys longicaudatus*).



Los síntomas iniciales suelen ser similares a los de una influenza intensa: fiebre alta, dolor muscular, dolor de cabeza y malestar general, generalmente sin congestión nasal. En algunos casos se suman síntomas gastrointestinales y dificultad respiratoria progresiva.

## ANTECEDENTE REGIONAL

Este traslado ocurre en un contexto regional marcado por un caso confirmado la semana pasada, luego de que el Instituto de Salud Pública confirmara la presencia del virus en un paciente de la zona, lo que derivó en el despliegue de protocolos de investigación epidemiológica y refuerzo de medidas preventivas en la comuna de Limache.

En lo que va de 2026, ese corresponde al único caso confirmado en la región de Valparaíso.

## LLAMADO A LA PREVENCIÓN

Las diversas autoridades de salud han hecho un llamado permanente a extremar medidas de autocuidado, especialmente en sectores rurales o viviendas que han permanecido cerradas por largo tiempo.

Entre las principales recomendaciones están ventilar por al menos 30 minutos antes de ingresar a una vivienda cerrada, utilizar mascarilla y guantes al limpiar, mantener despejados los alrededores de casas y bodegas, almacenar alimentos en envases sellados y acampar solo en lugares autorizados, evitando zonas con maleza o matorrales densos.

Ante la presencia de síntomas compatibles y antecedente de exposición en los últimos 45 días, se recomienda acudir de inmediato a un centro asistencial e informar sobre las actividades realizadas.