

Sonapesca hizo una revisión de los informes de los comités científicos para determinar el Con el propósito de entregar información transparente que permita conocer el estado de las pesquerías donde la pesca industrial tiene participación, la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca F.G.) ordenó y presentó los datos de los informes de los comités científicos, dando cuenta del Estado de las Biomazas respecto del Rendimiento Máximo Sostenible (BDRMS) 2025.

El informe, muestra que, actualmente nueve de 17 pesquerías se mantienen sobre el óptimo biológico —superior al 100%—, definidos por los comités científicos. El jurel sigue siendo el recurso pesquero con mejor desempeño desde 2013 (174% de BDRMS) hasta hoy. Pese a ello, sigue siendo la pesquería más sostenible, ratificando su buena salud que le valió el reconocimiento internacional tras la certificación Marine Stewardship Council (MSC) que convirtió al jurel en la pesquería sostenible más grande de Latinoamérica.

Esa buena salud también es seguida por la Anchoeta Arica-Antofagasta (131% de BDRMS) y Anchoeta Valparaíso-Los Lagos (143% de BDRMS). Asimismo, los crustáceos demersales, el Langostino Colorado Arica-Coquimbo (128% BDRMS),

Langostino Colorado Valparaíso-Biobío (117% BDRMS), Langostino Amarillo Atacama-Coquimbo (101% BDRMS), Langostino Amarillo Valparaíso-Biobío (103% BDRMS) y el Camarón Nailon Antofagasta-Biobío (123% BDRMS), también superan el óptimo biológico, pesquerías que

también cuentan con la certificación en sustentabilidad de MSC.

DESCENSOS

En cuanto a los pelágicos pequeños, la Anchoeta de Atacama-Coquimbo cayó a un 67% de BDRMS, al igual

que la Sardina Común de Valparaíso-Los Lagos a un 70% de BDRMS, luego de ocho años en el que estuvo cercano al 100%. La baja podría estar relacionada con el impacto de la ley de remanentes para la pesca artesanal (permiso para pescar cuotas no consumidas del año



anterior), la deficiente administración de las vedas móviles por parte de la Subpesca y la pesca bajo talla realizada en febrero de 2025, en la que se capturaron 170 mil t de sardina por parte de la flota artesanal mayor (embarcaciones sobre 15 m.)

En cuanto a la pesca demersal, la Merluza Común no evidencia un repunte, pese a que años anteriores tuvo un mejor desempeño, cayendo a un 60% de BDRMS, ocasionados por la pesca ilegal artesanal en la región del Maule, de hecho, según IFOP hay altos niveles de pesca no declarada (pesca ilegal) en la Caleta Curanipe. Asimismo, el efecto de la pesca con enmalle y las altas tasas de captura de ejemplares juveniles bajo talla, lo que la llevó a incumplir los requisitos de la Ley de Protección de Mamíferos Marinos (MMPA) de EE.UU., provocando la imposibilidad de exportar a este mercado productos de merluza común cuyo origen sea obtenido por medio del enmalle artesanal.