

Refuerzan vigilancia ante casos de influenza aviar en Chile

El SAG convocó a una mesa técnica con avicultores y organismos públicos para coordinar acciones preventivas.

Redacción
La Estrella

Con el objetivo de fortalecer la preparación sanitaria del territorio, esta mañana el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la Región de Arica y Parinacota realizó un nuevo Comité Zoonosario, tras la reciente detección de casos de influenza aviar de alta patogenicidad (H5N1) en aves silvestres y de traspatio en la región de Valparaíso y en aves silvestres en la región del Maule.

En el ámbito regional, el SAG convocó a una mesa técnica junto a avicultores y avicultoras, además de organismos del Estado como Senapred, la Seremi de Agricultura, la Seremi de Salud, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Conaf, Armada, Carabineros y Policía de Investigaciones de Chile, Municipalidad de Arica y otros servicios públicos, con el propósito de analizar el escenario sanitario y coordinar acciones preventivas ante la posible presencia de esta enfermedad en el país.



DESDE EL SERVICIO DESTACARON QUE EN LA REGIÓN NO SE HAN REGISTRADO CASOS DE ESTA ENFERMEDAD.

Si bien actualmente no existen casos positivos de influenza aviar en la Región de Arica y Parinacota, la autoridad informó que se reforzará la vigilancia sanitaria, especialmente considerando el movimiento de aves silvestres que se registra durante esta época del año, lo que podría aumentar el riesgo

de propagación del virus. El director regional del SAG, Álvaro Alegría Matus, hizo un llamado a reforzar las medidas de bioseguridad en los planteles avícolas, especialmente en la crianza de aves de traspatio. “Es fundamental que las y los criadores mantengan a sus aves en gallineros protegidos que

eviten el contacto con aves silvestres y otros animales, además de resguardar el agua y el alimento. También es importante limpiar y desinfectar periódicamente las instalaciones, controlar el ingreso de personas y utilizar ropa y calzado exclusivo para el manejo de las aves”, señaló.

RECOMENDACIONES

Desde el servicio también recordaron que algunos de los principales síntomas de influenza aviar en las aves incluyen falta de apetito, descoordinación, plumaje erizado, dificultad respiratoria con secreciones nasales, diarrea, disminución en la producción de huevos —

“Es fundamental que las y los criadores mantengan a sus aves en gallineros protegidos que eviten el contacto con aves silvestres y otros animales”.

Álvaro Alegría Matus
Director regional del SAG

con cáscara blanda o deformada —, hinchazón de cabeza y coloración azulada de cresta, barbillas y patas, además de postración y muerte. Asimismo, se solicitó la colaboración de la ciudadanía: en caso de detectar mortalidad masiva de aves, se recomienda no manipularlas y dar aviso al SAG a través del correo contacto.arica@sag.gob.cl, ya que la notificación oportuna permite realizar una detección temprana y activar rápidamente las medidas sanitarias correspondientes. ☺