

Todos protegidos: Personal Público de Salud en Atacama lidera cobertura más alta de vacunación Influenza a nivel país

Con el objetivo de disminuir los riesgos de contagio que pueda tener el personal sanitario y de esta forma mantener operativa la Red Asistencial para brindar atención a los usuarios y usuarias, es que resulta de vital importancia que el personal de salud cuente con su inmunidad al día contra la Influenza.

“Estamos muy contentos con la cobertura de vacunación contra la Influenza que lideran los funcionarios de nuestra Red Asistencial de la región, ya que a pocos días de comenzar con la campaña ya hemos logrado un 51.61% siendo la más alta a nivel país de su grupo objetivo. Agradecemos el compromiso que adquieren nuestros funcionarios y funcionarias, ya que el personal de salud está expuesto a distintos virus, sobre todo respiratorios en esta época, en especial Influenza. Al atender usuarios están expuestos a este tipo de infecciones, por lo que la invitación es a los funcionarios y funcionarias que aún no han realizado su vacunación, que lo realicen a la brevedad para que así cuenten con su inmunidad y de esa manera podamos evitar que enfermen gravemente” expresó el Director del Servicio de Salud Atacama, Bernardo Villablanca Llanos.

En este contexto, la región de Atacama presenta la cobertura más alta del grupo objetivo de los funcionarios públicos de la salud a nivel país con un 51.61%, seguido por la región del Magallanes con un 49.45%. En tanto los funcionarios de la salud del sector privado presentan un 40.52%. Por lo que, en este sentido, Marjorie Fuentes Díaz, encargada del Programa de Inmunizaciones del SSA explicó que: *“Nuestro llamado es a que todos los equipos de salud, sin importar dónde trabajen, se vacunen y se protejan a sí mismos y a sus usuarios, contribuyendo así a reducir el impacto de esta enfermedad en la comunidad.”*

La enfermedad de

la influenza puede ser asintomática hasta una infección grave. El período de incubación de la influenza suele ser de 2 días, pero puede variar de 1 a 4 días. Los síntomas respiratorios incluyen tos, dolor de garganta y secreción o congestión nasal, los síntomas sistémicos generalmente corresponden a fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, malestar general y mialgia, también pueden ocurrir vómitos y diarrea, especialmente en niños/as.

Algunas personas pueden presentar complicaciones, las más comunes incluyen neumonía bacteriana secundaria, exacerbaciones de afecciones respiratorias subyacentes, otitis media, laringotraqueobronquitis y bronquitis.

La mayoría de las complicaciones graves y muertes a causa de la influenza generalmente ocurren entre personas de 65 años o más. Otras personas de riesgo son aquellas con enfermedades crónicas, gestantes y niños/as, especialmente los menores de 2 años.

De esta forma, nuestra región está teniendo un nuevo impulso en la campaña de inoculación con la Influenza, a través del cual se espera incrementar logrando el 85% de funcionarios y funcionarias inoculadas. Es por ello que el personal puede acercarse a los vacunatorios de sus establecimientos para recibir dicha inmunización y las personas que son parte de los grupos objetivos pueden acudir a su Cesfam más cercano para recibir dicha inmunización.

