



SEREMI DE SALUD ACTIVÓ PROTOCOLO SANITARIO EN LA COMUNA.

Fallece niña de 7 años por contagio con hantavirus

HIJUELAS. *ISP confirmó segundo caso mortal en lo que va del año en la zona.*

El Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó un caso positivo de hantavirus en una niña de 7 años de la comuna de Hijuelas, quien falleció el pasado 24 de marzo en el Hospital Biprovincial Quillota Petorca. Se trata del segundo caso registrado en la Región de Valparaíso en lo que va de 2026.

Tras la confirmación, la Seremi de Salud activó de inmediato los protocolos de investigación epidemiológica y zoonótica en la comuna, con el objetivo de descartar nuevos contagios y reforzar las medidas preventivas tanto en el entorno familiar como en el establecimiento educacional de la menor.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Desde la autoridad sanitaria informaron que, hasta ahora, no se han detectado nuevos casos en Hijuelas y enfatizaron que “a la fecha se descartan nuevos casos de la enfermedad en la comuna”, aunque reiteraron el llamado a la comunidad a acudir oportunamente a un centro de salud ante la presencia de síntomas compatibles.

Asimismo, detallaron que se activó la vigilancia epidemiológica en la familia de la menor y se inició una investigación zoonótica en su establecimiento educacional, donde se han entregado recomendaciones preventivas. Equipos de la Seremi ya realizaron en primera instancia una visita en terreno y durante la jornada de ayer reforzaron nuevamente las medidas dirigidas a la comunidad educativa.

En paralelo, la red asistencial de la zona se mantiene coordinada ante la eventual apari-

“A la fecha se descartan nuevos casos de la enfermedad en la comuna”.

Seremi de Salud
Comunicado

ción de casos sospechosos, con el fin de asegurar un diagnóstico y tratamiento oportuno.

Este corresponde al segundo caso de hantavirus confirmado en la región durante 2026. El primero afectó a un hombre de 60 años de la comuna de Limache, quien posteriormente falleció a raíz de este virus.

PREVENCIÓN Y SÍNTOMAS

El hantavirus se transmite por la inhalación de partículas provenientes de orina, heces o saliva de roedores portadores. Sus síntomas iniciales pueden asemejarse a un resfriado o influenza, pero suelen presentarse con mayor intensidad y pueden incluir fiebre, malestar general, síntomas gastrointestinales y dificultad respiratoria.

La autoridad sanitaria reiteró las medidas preventivas, especialmente en zonas rurales o semirurales, como ventilar espacios cerrados antes de ingresar, utilizar mascarilla y guantes al limpiar, mantener despejados los alrededores de las viviendas y extremar precauciones en actividades al aire libre. Finalmente, insistieron en acudir de inmediato a un centro de salud ante síntomas y exposición en zonas de riesgo en los últimos 45 días”.

CS