

Debido a retos virales en redes sociales

Consumo de paracetamol ha aumentando en más de 500% en menores de edad

● Los datos entregados por el Minsal indican que el alza se ha visto en forma sostenida desde al menos 2006.

Crónica
 periodistas@elpinguino.com

EP PÁGINA WEB

El Ministerio de Salud (Minsal) alertó que, en los últimos años, las intoxicaciones por paracetamol en menores de edad han aumentado en más de 500%, un fenómeno que se observa de forma sostenida

“

El paracetamol es un fármaco seguro, pero su consumo en exceso puede producir efectos nocivos y graves para la salud. Provoca daño hepático que incluso lleva a un trasplante o a la muerte”.

Doctora Claudia Astudillo, pediatra Uandes.

al menos desde 2006.

La autoridad vincula este incremento a la circulación de retos virales en redes sociales, donde niños y adolescentes consumen grandes cantidades de este medicamento como parte de desafíos.

El paracetamol es un fármaco de uso común para aliviar el dolor y bajar la fiebre, ampliamente disponible y considerado seguro en dosis adecuadas.

En ese sentido, la doctora Claudia Astudillo, pediatra y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes (Uandes), indica que su uso debe ser siempre supervisado. “El paracetamol es un fármaco seguro, pero su consumo en exceso puede producir efectos nocivos y graves para la salud. Provoca daño hepático que incluso lleva a un trasplante o a la muerte. De ahí la importancia de que su consumo sea bajo supervisión o indicación médica”, advierte.

Síntomas tardíos y riesgo progresivo

Uno de los mayores riesgos es que los efectos de la



La profesional explicó que si se sospecha de consumo excesivo se debe consultar durante las primeras ocho horas.

intoxicación por este medicamento no aparecen de inmediato y pueden presentarse incluso después de 48 horas, explica la experta.

En una primera etapa habría náuseas, vómitos y malestar general, comenta la doctora. Con el paso de las horas, el cuadro puede evolucionar a un daño hepático grave, con coloración amarillenta de la piel y ojos, orina oscura y, en etapas avanzadas, alteraciones neurológicas.

Por eso, la clave está en no esperar señales evidentes.

“Si se sospecha un consumo excesivo, hay que consultar dentro de las primeras ocho horas, considerando que en ese periodo no hay síntomas”, advierte Astudillo.

¿Qué hacer ante una sospecha?

Frente a un posible caso, la recomendación es actuar de inmediato. “Ante la sospecha, hay que acudir a urgencia incluso aunque no haya síntomas. El tratamiento es más efectivo si se administra en las primeras ocho horas tras la ingesta”, afirma la especialista.