

347 cisnes de cuello negro han muerto en La Araucanía a causa de la gripe aviar

ALERTA SANITARIA. *En las últimas semanas se han sumado nuevos brotes en traspatios que han afectado a aves domésticas. SAG llama a mantenerse alerta.*

El Austral
 cronica@australtemuco.cl

Un total de 347 cisnes de cuello negro han muerto a la fecha en el sector de Lago Budi, en la comuna de Saavedra, a causa de gripe aviar, de acuerdo con lo señalado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Este brote en la zona costera se suma a los focos detectados desde mediados de marzo en La Araucanía y que tienen a la Región en alerta sanitaria ante el avance de la Influenza Aviar Altamente Patógena.

“Tenemos nueve comunas con hallazgo de positividad en aves de distintas especies, siendo principalmente afectados cisnes de cuello negro en el Lago Budi”, señaló Rolando Sepúlveda, médico veterinario encargado regional de Protección Pecuaria del SAG, quien agregó que “se está trabajando en un traspatio, también junto al Lago Budi, donde se pesquió la positividad con 40 aves que fueron desplazadas, contando con apoyo del municipio y de la mesa integrada de los servicios con Senapred, donde están la Seremi de Salud, Ser-

“Tenemos nueve comunas de La Araucanía con hallazgo de positividad en aves de distintas especies, siendo principalmente afectados cisnes de cuello negro en el Lago Budi”.

Rolando Sepúlveda,
 Protección Pecuaria Regional

napesca, SAG, Indap”.

Sepúlveda señaló que se ha realizado un potente trabajo en la zona costera regional en materia de información, contando con el apoyo de Chilehuevos, que estuvo presente en las capacitaciones donde se abordaron las medidas preventivas.

COMUNAS

Renaico fue la comuna donde se detectó el primer brote de gripe aviar en La Araucanía, en un traspatio. Luego se detectaron casos en Galvarino, el mencionado caso de los cisnes del Lago Budi y en una avícola de Cunco, el primer caso de un plantel comercial, donde se debieron sacrificar 122.053 gallinas.



EL CISNE DE CUELLO NEGRO ES LA ESPECIE SILVESTRE MÁS AFECTADA POR LA GRIPE AVIAR EN LA ARAUCANÍA.

En las últimas semanas se han agregado nuevos brotes, sumando a las comunas de Loncoche, Carahue, Victoria, Nueva Imperial y Vilcún.

“Dentro de lo nuevo, en Imperial se realizó el hallazgo de una especie silvestre, un cisne de cuello negro, muerto al interior de un potrero en la localidad de Coipuco, al que tomamos las muestras, resultando positivas”, apuntó Ro-

lando Sepúlveda, quien agregó que “además, en la comuna de Vilcún, en un sector de una comunidad donde se detectó positivo en dos traspatios ubicados en las cercanías de aves de corral que se vieron afectadas en ese sector”.

El encargado regional de Protección Pecuaria del SAG señaló que pese a las cifras anteriores, la situación epidemiológica se mantiene esta-

ble en la Región.

El resumen de las aves afectadas en La Araucanía, de acuerdo con el registro que lleva el SAG en su sitio web, señala que hasta ayer se contabilizaban 122.724 aves domésticas (122.053 correspondiente a la avícola cunquina y 671 en traspatios). En cuanto a aves silvestres, son 478 afectadas, 347 de ellas cisnes de cuello negro.

CS