



Editorial

Prevención del hantavirus

En lo que va de 2026 se han notificado nueve casos de hantavirus en Chile, cuatro de ellos con consecuencia de muerte.

El Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud ha informado que en lo que va de 2026 se han notificado nueve casos de hantavirus en Chile, cuatro de ellos con consecuencia de muerte, por lo cual se ha reforzado la alerta epidemiológica vigente, con algunas indicaciones destinadas a la Red Asistencial y a los equipos de las autoridades sanitarias regionales. Se ha pedido también poner énfasis en la sospecha clínica de los casos y poder establecer un diagnóstico precoz para la oportuna derivación a los establecimientos asistenciales. A la vez, se ha llamado a las personas para que frente a signos como fiebre, cefalea, síntomas gastrointestinales o dificultad respiratoria, acudan a un centro de salud y reporten antecedentes de actividades de riesgo o exposición a roedores silvestres. De acuerdo con el Ministerio, las recomendaciones se dirigen especialmente a quienes durante estas vacaciones van a camping, y se les ha ins-

El periodo más complejo de la enfermedad se da entre enero y marzo, cuando las familias salen de vacaciones.

truido para que utilicen carpas sin agujeros, con cierres y pisos en buen estado, mantener alimentos y agua en recipientes herméticos, botar la basura en contenedores con tapa y elegir terrenos debidamente autorizados que reúnan

las condiciones para acampar.

Se ha reiterado a los veraneantes la necesidad de ser cuidadosos al llegar a cabañas que han estado cerradas y que por falta de limpieza y ventilación podrían contener el hantavirus y se ha pedido a las familias que eviten conductas de riesgo, como internarse en matorrales o recoger frutos silvestres.

El periodo más complejo de la enfermedad se da entre enero y marzo, cuando las familias salen de vacaciones. La incubación del virus en personas contagiadas toma entre 20 y 45 días. Estos pacientes necesitan ser diagnosticados oportunamente y derivados a hospitales con camas UTI, ya que su manejo es complejo y requiere atención especial.