

Editorial

Vacunación contra Virus del Papiloma Humano

Recientemente comenzó la vacunación escolar del segundo semestre, que beneficiará a poco más de 63 mil estudiantes de enseñanza básica en la Región del Biobío. Las autoridades de Salud han señalado que 22 mil alumnos de cuarto año básico tendrán la protección contra el virus del papiloma humano (VPH), y 41 mil de primero básico y octavo que recibirán la inmunización contra la difteria, tétanos y tos convulsiva.

Este proceso se lleva a cabo en los establecimientos educacionales y forma parte del Plan Nacional de Vacunación que cada año lleva adelante el Ministerio de Salud. Desde el año pasado se incorporó una vacuna noavalente contra el VPH, que pasó de 4 a 9 serotipos, por lo que al tener mayor efectividad ahora solo requiere una dosis.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que una buena parte de las mujeres sexualmente activas sufrirán cáncer de cuello uterino en algún momento de su vida. Por ello, con frecuencia se informa a la población sobre la importancia de que se efectúen en forma periódica controles ginecológicos, considerando que es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres mayores de 35 años, en todo el mundo. Esta enfermedad es causada por el virus del papiloma humano, que se contagia por contacto sexual.

Desde el año 2014, el Ministerio de Salud de Chile incluyó dentro del Plan Nacional de Inmunización la vacuna contra el VPH, inicialmente en dos dosis, para niñas de cuarto y quinto básico en todos los colegios. Sin embargo, los estudios indican que los hombres transmiten el virus, pudiendo ser portadores sin tener conocimiento de esta condición, por lo que se sugirió la vacuna también para los niños.

La aparición de este cáncer es más frecuente entre los 35 a 55 años, pero debido a que el tiempo entre la infección por VPH y el desarrollo de la patología es de veinte años en promedio, las personas con más riesgo de infectarse son las niñas y adolescentes. Por ello, se recomien-

da la vacunación a la edad más temprana posible.

Este es un virus muy común, pero dependiendo de sus características de riesgo, puede causar en las mujeres más de 70% de los cánceres uterinos. De ahí la seriedad con la que los gobiernos han asumido este plan de inmunización. Los especialistas señalan que este cáncer no presenta síntomas hasta que se encuentra ya avanzado, de manera que la prevención es fundamental para evitar que se desarrolle esta enfermedad, que en Chile causa más de 600 muertes anuales de mujeres jóvenes.

La tasa de incidencia de este tipo de cáncer en nuestra Región del Biobío ha sido de 17,8 por cada 100 mil habitantes, que implica cerca

de 150 casos anuales. Este cáncer es el cuarto de mayor incidencia entre todos los tipos que se registran en nuestra zona. Si bien el principal factor de riesgo es la infección por el VPH, también influyen el tabaquismo, el consumo prolongado de anticonceptivos orales, la inmunodepresión, la edad temprana en el momento de la primera relación sexual y el número elevado de parejas sexuales.

Desde el inicio de esta campaña en 2014, se han aplicado más de un millón de dosis de vacunas en el país en este grupo objetivo y no se han presentado efectos adversos de consideración, por lo que se trata de una vacuna segura, aunque hace unos años se difundió por las redes sociales el rechazo a la inmunización, lo que se explicaba por la desinformación de los padres. Se ha estudiado a más de 65 millones de personas vacunadas en Estados Unidos, sin descubrir reacciones adversas distintas a las de cualquier vacuna.

La Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología recomienda la vacunación rutinaria para niñas de 9 a 17 años. También ha sugerido que las mujeres se realicen el test del VPH a partir de los 30 años, el Papanicolaou cada tres años, a partir de los 25 años, mantener una dieta equilibrada, evitar el sobrepeso, no fumar y usar preservativo en las relaciones sexuales.

La tasa de incidencia de este tipo de cáncer en nuestra Región del Biobío ha sido de 17,8 por cada 100 mil habitantes, que implica cerca de 150 casos anuales. Es el cuarto de mayor incidencia en la zona.