



Editorial

Campaña de vacunación

El inicio temprano de la campaña pretende que los grupos de mayor riesgo estén protegidos antes del invierno

El Ministerio de Salud inició la vacunación contra el neumococo, la influenza, el covid 19, el coqueluche y el virus respiratorio sincial (VRS) con el fin de prevenir enfermedades respiratorias en los grupos objetivos, como es el caso de las embarazadas, los adultos mayores, los recién nacidos y los escolares de hasta quinto básico.

El inicio temprano de la campaña pretende que los grupos de mayor riesgo estén protegidos antes de que comience el invierno, cuando aumentan los virus. La estrategia consiste en ampliar las oportunidades para que las personas concurren a los vacunatorios y fortalecer las campañas comunicacionales.

Entre los grupos que deben vacunarse contra la influenza y el covid 19 están el personal de salud (público y privado), personas de 60 años y más, pacientes con patologías crónicas (desde los 6 meses en covid y entre los 11 y 59 años en influenza), gestantes y cuidadores de

Hay muchos virus circulando con alto número de infectados.

personas mayores y funcionarios de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam).

El Ministerio de Salud ha dicho que todos los años la Organización Mundial de la Salud

(OMS) estudia los virus que circulan en cada hemisferio y proyecta, en función de lo ocurrido en el invierno del hemisferio norte, los tipos de virus que serán más importantes en nuestro hemisferio. Sobre la base de este estudio, la OMS entrega a los fabricantes las recomendaciones para la elaboración de las vacunas a utilizar en la inmunización. Chile cuenta con una robusta red de vigilancia epidemiológica, altos niveles de vacunación de refuerzo, además de un bajo impacto de los contagios en el número de fallecimientos, hospitalizaciones y ocupación de camas críticas.

Hay que estar atentos ya que los expertos indican que hay muchos virus circulando con alto número de infectados, más aun considerando que un número importante de personas no se realiza la detección en forma oportuna. De ahí que se ha pedido a la población en riesgo que concurra a los vacunatorios.

