

Fecha: 14-01-2026
Medio: La Discusión
Supl. : La Discusión
Tipo: Noticia general

Pág. : 10
Cm2: 137,6
VPE: \$ 137.060

Tiraje:
Lectoría:
Favorabilidad:

3.500
Sin Datos
☐ No Definida

Título: Realizan vigilancia preventiva para evitar aparición de mosca de la fruta

Realizan vigilancia preventiva para evitar aparición de mosca de la fruta



Como parte del Sistema Nacional de Detección Temprana de Mosca de la Fruta (*Ceratitis capitata*), el Servicio Agrícola y Ganadero de Ñuble realiza una campaña de prospección, que apunta a mantener la vigilancia en la región y estar alerta frente a la posibilidad de una captura.

La campaña, considera tres rutas con 88 trampas en la ciudad de Chillán en diferentes frutales hospederos como nísperos, ciruelos y cerezos y avanzando la temporada, pasar a otros frutales de acuerdo al estado de madurez de los frutos. De esta forma, el Servicio está preparado ante una eventual aparición de este insecto que constituye una plaga agrícola de importancia económica que afecta a más de 250 tipos de frutales hospederos.

El director regional del Servicio, Osvaldo Alcayaga, destacó que se trata de una medida que busca estar preparados en caso de una detección, por lo que destacó la importancia de esta vigilancia, que se realiza en las zonas urbanas, semiurbanas y rurales de la región. A nivel nacional, existe una red de más de 10 mil trampas, que se revisan periódicamente con el fin de detectar preventivamente la aparición de un ejemplar. A mayor temperatura, disminuyen los ciclos biológicos de los insectos, y en Ñuble, la revisión se hace cada siete días. Para realizar la revisión, personal SAG debidamente identificado trabajan revisando las trampas y verificando que los ejemplares capturados no correspondan a la plaga, para lo cual han sido capacitados para su detección.

Una de las principales causas de la aparición de ejemplares de esta plaga es el ingreso ilegal de frutas y vegetales que llegan al país a través de pasos no habilitados desde países vecinos, por lo que la recomendación es siempre seguir las recomendaciones del SAG con respecto a la internación de frutas y vegetales, a fin de evitar la propagación de esta plaga.