

Pág.: 11 Cm2: 380,7 Fecha: 06-06-2025 10.000 Tiraje: Medio: El Sur Lectoría: 30.000 Supl.: El Sur Favorabilidad: No Definida

Tipo: Noticia general

Título: Los ecosistemas resistieron cambios muy abruptos en el pasado, pero ahora pueden colapsar

Según análisis de 3.000 fósiles de especies extintas

Los ecosistemas resistieron cambios muy abruptos en el pasado, pero ahora pueden colapsar

Un equipo de científicos ha comprobado la capacidad de adaptación que tenían los ecosis-temas del pasado a las perturba-ciones más abruptas, como las glaciaciones, pero ha alertado de que el ritmo al que se extinguen las especies en la actualidad pue-de ser demasiado elevado para que los ecosistemas resistan sin

colapsar. Investigadores de varios países analizaron más de 3.000 fósiles de especies extintas que habitaron el planeta durante los últimos 60 millones de años para llegar a esa conclusión, y publicaron los re-sultados de su trabajo en la revista Nature Communications

La historia de la Tierra está marcada por numerosos cam-

bios ambientales, como glaciaciones o movimientos tectóni-cos, que han modificado de for-ma radical los ecosistemas, ha señalado el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) de España en una nota de

Los científicos comprobaron cómo, a lo largo de los últimos como, a lo largo de los utilhos so millones de años, muchos de los grandes herbívoros que mo-delaron aquellos paisajes fueron desapareciendo, pero eran susti-tuidos por otros que cumplían los mismos roles ecológicos, de

nos mismos roies ecologicos, de manera que el sistema se mante-nía cohesionado. "Parece que lo importante no es tanto mantener las especies sino sus funciones e interacciones con

el sistema", ha observado el inveselsistema", ha observado el investigador del Museo de Ciencias Naturales, Juan López Cantalapiedra, yseñala que el problema en la
actualidad es que "el ritmo de extinción es tan acelerado que estamos poniendo en peligro al ecosistema en su conjunto".

Desde los mastodontes hasta
los antiques prioperportes y cier-

los antiguos rinocerontes y ciervos gigantes, los grandes herbívo-ros han moldeado los paisajes te-rrestres durante millones de años, rrestres durante millones de años, explica el MNCN, y detalla que con su manera de actuar y ali-mentarse moldeaban la vegeta-ción, dispersaban semillas e in-fluían en todo, desde la salud del suelo hasta los patrones de incen-dios forestales, como "auténticos ingenieros de los ecosistemas".



El estudio se basa en la evidencia rescatada de los fósiles.

GRANDES CAMBIOS

"Descubrimos que estos ecosis-temas se mantuvieron sorpren-dentemente estables durante largos periodos de tiempo, incluso cuando las especies iban y ve-nían", explica Fernando Blanco, investigador de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). Los investigadores también ob-

servaron que en dos ocasiones la

presión ambiental fue tan inten sa que todo el sistema sufrió una reorganización global que alteró permanentemente la estructura ecológica de las comunidades de grandes herbívoros.

El primer gran cambio ocurrió hace unos 21 millones de años, cuando los movimientos tectóni-cos de Eurasia y África cerraron el antiguo mar de Tetis y formaron

el conocido como puente terres-tre de 'Gomphotherium' que unió ambos continentes durante cua-tro millones de años.

Ese nuevo corredor permitió una oleada de migraciones que re modelaron los ecosistemas en to do el plan eta, y entre los migran-tes estaban los antepasados de los elefantes modernos, que habían evolucionado en África y comenzaron entonces a expandirse por Europa y Asia. Pero el cambio fue mucho más

allá de los elefantes ciervos, cer-dos, rinocerontes y muchos otros grandes herbivoros tam-bién se trasladaron a nuevos te-rritorios, alterando el equilibrio

ecológico. El segundo gran cambio global llegó hace unos 10 millones de años, cuando el clima de la Tierra anos, cuando el clima de la Tierra se volvió más frío y seco. La ex-pansión de las praderas y la dis-minución de los bosques dieron lugar al auge de especies pastado-ras con dientes más resistentes, y a la desaparición gradual de mu-chos herbívoros forestales, y ese periodo marcó el inicio del largo declive en la diversidad funcional de estos animales.