

Fecha: 05-07-2025
 Medio: El Pingüino
 Supl.: El Pingüino
 Tipo: Noticia general
 Título: Nuevo test para VPH podría transformar la prevención del cáncer cervicouterino en Chile

Pág.: 22
 Cm2: 373,9
 VPE: \$ 447.955

Tiraje: 5.200
 Lectoría: 15.600
 Favorabilidad: ☐ No Definida

Al integrarse al GES

Nuevo test para VPH podría transformar la prevención del cáncer cervicouterino en Chile

● El Minsal considerará la incorporación de un examen de vanguardia cuya capacidad de detección anticipada es de un 94%, muy superior al 30% que alcanza el tradicional Papanicolau.

Jesús Nieves
 jnieves@elpinguino.com

El Ministerio de Salud (Minsal) está actualizando las prestaciones incluidas en el Decreto GES (Garantías Explícitas en Salud). En este proceso, se analizará

“

El cáncer de cuello uterino es una patología que causa una muerte cada 90 segundos en el mundo y, en nuestro país, dos muertes al día, todo esfuerzo que hagamos para diagnosticar la enfermedad en su etapa preinvasora (cuando aún es asintomática) tendrá un gran impacto en la disminución de la incidencia y la mortalidad por esta causa”, explica el doctor Omar Nazzal, ginecólogo onco-

Omar Nazzal, ginecólogo oncó-

logo, jefe de la Unidad de Patología Cervical del hospital San Borja Arriarán. Dado lo anterior, la incorporación del test PCR al GES para detección de infección por VPH es inminente. Su introducción permitiría detectar lesiones de alto grado a tiempo, reducir los falsos negativos y extender el intervalo de testeo a cinco años si el resultado es negativo.

Con más de 200 mil pruebas realizadas, el test PCR-VPH ya ha sido aplicado en 13 servicios de salud públicos mediante un programa piloto.

El test PCR-VPH ya ha sido aplicado en 13 servicios de salud públicos mediante un programa piloto.

por el Minsal. Sin embargo, su cobertura actual alcanza apenas al 5% de la población objetivo. Este indicador refleja una inequidad estructural, ya que mientras las afiliadas a isapre pueden acceder al test

logo, jefe de la Unidad de Patología Cervical del hospital San Borja Arriarán. Dado lo anterior, la incorporación del test PCR al GES para detección de infección por VPH es inminente. Su introducción permitiría detectar lesiones de alto grado a tiempo, reducir los falsos negativos y extender el intervalo de testeo a cinco años si el resultado es negativo.

Con más de 200 mil pruebas realizadas, el test PCR-VPH ya ha sido aplicado en 13 servicios de salud públicos mediante un programa piloto liderado

mediante la modalidad de libre elección, las beneficiarias de Fonasa sólo pueden realizarlo si hay disponibilidad, debido al bajo stock en los consultorios.



Con más de 200 mil pruebas realizadas, el test PCR-VPH ya ha sido aplicado en varios servicios de salud.

mediante la modalidad de libre elección, las beneficiarias de Fonasa sólo pueden realizarlo si hay disponibilidad, debido al bajo stock en los consultorios.

Para Nazzal, es fundamental democratizar el acceso a este test: “La equidad en salud debe ser nuestro objetivo, y el acceso a este tipo de tecnología debe estar ga-

rantizado para todas. Si no incluimos este examen en el Decreto GES, un porcentaje de la población no podrá acceder a este mecanismo de detección”, enfatizó.