

Fecha: 01-04-2026

Medio: La Estrella de Arica

Supl.: La Estrella de Arica

Tipo: Noticia general

Título: Tasa de tuberculosis bajó pero sigue alta a nivel nacional

Pág.: 4

Cm2: 280,0

Tiraje:

Lectoría:

Favorabilidad:

7.300

21.900

☐ No Definida

Tasa de tuberculosis bajó pero sigue alta a nivel nacional

De los 101 casos en 2025, el 70% se concentra en hombres, en su mayoría, entre los 30 y 70 años.

Constanza Vergara Barreda
constanza.vergara@estrellaarica.cl

Durante 2024, en la región de Arica y Parinacota se registraron más de cien personas diagnosticadas con tuberculosis, alcanzando una tasa de incidencia de 37 casos por cada 100 mil habitantes. En 2025, en tanto, la tasa descendió a 34 casos por 100 mil. Pese a esta leve disminución, el número total de casos se ha mantenido estable en el tiempo, con cerca de un centenar de notificaciones anuales, lo que mantiene a Arica entre las regiones con mayor incidencia a nivel nacional.

De hecho, durante 2025 se confirmaron 101 casos de tuberculosis en todas sus formas, de los cuales el 70% correspondió a hombres, concentrándose principalmente en personas entre los 30 y 70 años y más.

Según informó la sere-



EN LA REGIÓN, EXISTE UNA MESA INTERSECTORIAL DEL PROCET QUE PLANIFICA ACCIONES EDUCATIVAS.

34

casos por cada 100 mil habitantes se registraron en 2025, y el año anterior, fueron 37 por cada 100 mil individuos.

mi de Salud de Arica y Parinacota, Karla Kepec, esto responde principalmente a las determinantes sociales de la salud. En ese sentido, explicó que se trata de una enfermedad históricamente asociada a condiciones de hacinamiento y vulnerabilidad.

“Como la falta de acceso a saneamiento básico, la malnutrición por déficit, el consumo de hábitos no-

civos y la situación de calle. A ello se suma la condición geográfica de la región, que limita con países de alta carga de la enfermedad, como Perú y Bolivia”, detalló.

“Esta enfermedad presenta mayor incidencia en grupos de riesgo, como personas de nacionalidad extranjera, pertenecientes a pueblos originarios, con consumo de hábitos nocivos y con coinfección retroviral”, agregó la autoridad sanitaria.

SÍNTOMAS ASOCIADOS A LA TUBERCULOSIS

Entre sus principales síntomas se encuentran la tos con expectoración por más de 15 días, acompaña-

da de fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, disminución del apetito, decaimiento y dolor en la espalda y el tórax.

Por ello, y a partir de estas cifras, Kepec abordó las medidas implementadas para la detección oportuna y el control de la enfermedad en la región. Una de ellas es el Programa de Control y Eliminación de la Tuberculosis, que realiza pesquisa activa en centros de salud mediante muestras de esputo, con resultados en 24 horas para confirmar o descartar la enfermedad. A esto se suman operativos en distintos sectores de la ciudad, enfocados en la prevención y educación.