

Fecha: 10-07-2025
Medio: La Discusión
Supl.: La Discusión
Tipo: Noticia general

Pág.: 7
Cm2: 448,6

Tiraje:
Lectoría:
Favorabilidad:

3.500
Sin Datos
☐ No Definida

Título: Pingüino de en Concepción Magallanes herido y fue trasladado a varó en Cobquecura centro de atención



Anida desde Coquimbo,(29° latitud S), hasta el Cabo de Hornos.

LA ESPECIE FUE ESTABILIZADA EN TERRENO

Pingüino de Magallanes herido varó en Cobquecura y fue trasladado a centro de atención en Concepción

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) activó el protocolo de rescate correspondiente, para determinar su estado de salud y evaluar las medidas a aplicar.

NOMBRE PERIODISTA
nombre@ladiscusion.cl
FOTOS: NOMBRE GRÁFICO

Este miércoles, un ejemplar de pingüino de Magallanes fue encontrado varado en la costa de Cobquecura, Provincia de Itata, con heridas visibles en su cuerpo.

Ante el hallazgo del ave, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) activó el protocolo de rescate correspondiente, para determinar su estado de salud y evaluar las medidas a aplicar.

La especie fue estabilizada en terreno y posteriormente trasladada hasta el Centro de Atención Primaria de Fauna Marina de la Universidad San Sebastián en Concepción, donde recibirá atención veterinaria especializada.

El estado de salud del pingüino será evaluado en las próximas horas.

Sernapesca describe que el Pingüino de Magallanes tiene cuerpo fusiforme y de gran hidrodinamia, adaptado para nadar, con plumaje negro en el dorso y blanco en pecho y abdomen. Tiene una altura de 70 centímetros y un peso promedio de cuatro kilogramos. Con tamaño y apariencia similar al Pingüino de Humboldt, el Pingüino de Magallanes se diferencia del anterior porque tiene dos franjas negras enmarcando

pecho y abdomen en lugar de una franja. A lo largo del recorrido de ellas hay motas de manchas negras. En la base del pico negro, hay piel color rosada. Las patas palmeadas son negras, moteadas con manchas rosadas.

Distribución geográfica

Las colonias de reproducción se distribuyen en el océano Pacífico desde Coquimbo, (29° latitud S), hasta el Cabo de Hornos (Chile), y en el Atlántico desde Golfo San Matías al sur incluyendo las Islas Falklands. Se concentran en los meses de primavera y verano y se dispersan en invierno hacia el norte alcanzando en el Pacífico hasta sur de Perú y en el Atlántico hasta la costa noreste de Brasil. En Chile la colonia reproductiva más importante está ubicada en Monumento Natural Los Pingüinos en Isla Magdalena, Punta Arenas, administrada por Conaf.

Atención

La especie fue estabilizada en terreno y posteriormente trasladada hasta el Centro de Atención Primaria de Fauna Marina de la Universidad San Sebastián en Concepción, donde recibirá atención veterinaria especializada.