

Fecha: 03-07-2025

Medio: El Sur

Supl.: El Sur

Tipo: Noticia general

Título: Vacuna contra la influenza tiene baja cobertura en mayores de 60 y embarazadas

Pág.: 4

Cm2: 863,9

Tiraje:

Lectoría:

Favorabilidad:

10.000

30.000

■ No Definida


Este martes el Minsal inició la vacunación para todo el país debido a la alta circulación de virus respiratorios. En el Biobío el rinovirus e influenza son los más altos, junto al VRS.

Por Estefany Cisternas Bastías
estefanycisternas@diarielsur.cl

Expertos de salud llamaron a reforzar la vacunación contra la influenza a nivel regional, esto debido a que persisten grupos de riesgos sin superar el 80% de cobertura y que el Ministerio de Salud decidió abrir la vacunación a la población general. En el Biobío, al 27 de junio la cobertura de vacunación contra la influenza llegó al 74,3%. Los grupos que superaron el 100%, según información de la Seremi de Salud, corresponde a los criadores de cerdos y aves, usuarios y trabajadores de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores y Personal de Salud Privado. Le sigue el personal de salud público (99,1%), trabajadores de la Educación (98,4%), escolares de 6 a 10 años (85,3%) y personas con enfermedades crónicas de 11 a 59 años (81,8%). Aquellos con menor cobertura son la estrategia Capullo (37,7%), embarazadas (56,7%) y personas de 60 años y más (63%).

También se debe considerar que actualmente los virus respiratorios con mayor circulación acumulada a nivel regional corresponden al rinovirus (34,1%) e influenza A (31,6%), sumado a que se evidenció que el virus respiratorio sincicial (VRS) tuvo un nuevo aumento de un 36,2% a fines de junio.

"Considerando la actual situación epidemiológica y el descenso de las temperaturas, como autoridad sanitaria estamos poniendo el énfasis en 4 puntos, correspondientes a: inoculación contra el virus respiratorio sincicial en lactantes; poner al día la vacunación contra la influenza, especialmente en adultos mayores, que se sitúan bajo el promedio regional; reconocer signos y síntomas de las enfermedades respiratorias, y hacer un buen uso de la red asistencial, asistiendo a la atención primaria ante síntomas generales y a los servicios de urgencia en el caso de síntomas de gravedad", in-



El Ministerio de Salud optó por adelantar la Campaña de Invierno para toda la comunidad este mes debido a la alta circulación viral registrada.

A nivel regional se alcanzó el 74,3%

Vacuna contra la influenza tiene baja cobertura en mayores de 60 y embarazadas

dicó el seremi de Salud, Eduardo Barra.

PANORAMA REGIONAL

Miguel Aguayo, jefe de Campaña de Invierno del Hospital Guillermo Grant Benavente (HGGB), detalló que el centro de salud mantiene mucha consulta y demanda desde el ámbito infantil de pedia-

tría, específicamente de menores de 15 años, porque hay un brote de virus sincicial respiratorio que ha implicado una alta necesidad de camas para niños. "En estos momentos casi el 60% de los pacientes que están en la UCI pediátrica y UTI pediátrica son con cuadros respiratorios estacionales. Así que en el ámbito pediátrico se ha mantenido la alta demanda y la alta consulta, pero el hospital ha dado respuesta y solución a todos los pacientes. En el ámbito adulto seguimos por consulta respiratoria, tanto por virus influenza como por virus sincicial respiratorio. Sin embargo, el volumen de ingresos en UCI con pacientes ventilados es solo un 20%, mucho menor que en

el área pediátrica. En el área adulta son pacientes no vacunados o que tienen comorbilidad no tratada", explicó Aguayo.

Desde el Servicio de Salud Talcahuano (SST) relataron que la última semana epidemiológica, comprendida entre el 22 y 28 de junio, la Red de Urgencia hospitalaria del servicio integrada por los hospitales Las Higueras, de Tomé y Penco-Lirquén, tuvo 3 mil 123 atenciones de urgencias, de las cuales 467 fueron por causas respiratorias. Las causas más frecuentes fueron laringitis, faringitis, bronquitis y neumonía.

Por su parte, desde la Seremi precisaron que se registra en forma acumulada durante el presente

año un 13,5 menos de consultas de urgencia por enfermedades respiratorias y un 16% menos de hospitalizaciones en comparación al año pasado. Todos los segmentos de edad disminuyen las consultas de urgencia, excepto los menores de 1 año. De igual forma observan un descenso en las hospitalizaciones respecto a semanas anteriores, pero la proporción se mantiene alta en menores de 1 año, en el segmento de 1 a 4 años, así como de 5 a 14 años.

VACUNACIÓN INFLUENZA

Esta semana el Ministerio de Salud (Minsal) informó que se amplió la cobertura de la vacunación contra la influenza hacia el público general, esto de manera gratuita. La medida comenzaba generalmente en el mes de agosto, sin embargo, optaron por adelantarla para julio debido a la alta circulación viral registrada en lo que va del invierno. El Minsal dio a conocer que la vacuna de influenza se encuentra disponible para toda la población y se puede solicitar en vacunatorios de la red pública de salud; centros privados en convenio con las Seremi de Salud y operativos de vacunación extramurales implementados localmente. Asimismo, el Minsal tiene la plataforma llamada mevacu.no.cl, sitio donde se puede acceder y revisar todos los puntos de vacunación que se encuentran habilitados a nivel regional.

Junto con el refuerzo de la inmu-

36,2%

fue el aumento de la circulación del virus respiratorio sincicial (VRS) la última semana de junio a nivel regional.

• Tasa de rechazo

La autoridad sanitaria del Biobío señaló que la tasa de rechazo regional ante la vacunación contra la influenza, durante este año, llega sólo al 0,4%.

nización, la autoridad sanitaria recordó a la población las principales medidas de prevención de enfermedades respiratorias, donde destacan: no exponer a niños a personas con síntomas respiratorios, lavado constante de manos, evitar lugares muy concurridos, reducir al máximo el frío y la humedad dentro del domicilio, controlar los cambios bruscos de temperatura, no fumar ni encender o apagar estufas y/o braseros al interior del hogar; además de hacer uso de mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios.

Los virus respiratorios con mayor circulación a nivel regional son al rinovirus e influenza A, sumado a que se evidenció un aumento del virus respiratorio sincicial (VRS).