

13 mujeres murieron por cáncer cervicouterino en 2025

Tasa de mortalidad alcanzó 1 por cada 100 mil mujeres, con un alza de 85,7% respecto del año anterior.

Constanza Vergara Barreda
 constanza.vergara@estrellaarica.cl

Luego de la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Cáncer Cervicouterino, la enfermedad se mantiene como una de las principales amenazas para mujeres en edad sexualmente activa en Chile. De acuerdo con cifras preliminares del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud, cada año más de mil personas son diagnosticadas y más de 600 fallecen por esta causa.

Dicha enfermedad se origina en las células del cuello uterino, que corresponde a la parte inferior del útero que conecta con la vagina. En más del 95% de los casos está asociada al Virus del Papiloma Humano, especialmente a los tipos 16 y 18, que se transmiten principalmente por contacto de piel a piel.

Se estima que cerca del



AGENCIAUNO

LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER CERVICOUTERINO INCLUYE LA VACUNACIÓN GRATUITA CONTRA EL VPH EN 4TO. BÁSICO.

80% de las personas sexualmente activas contraerá el virus en algún momento de su vida. No obstante, entre el 80% y el 90% lo eliminará de forma natural, aunque en algunos casos la infección puede persistir y derivar en cáncer.

Según la Fundación Arturo López Pérez, en la Región de Arica y Parinacota, durante 2025, se registraron 13 mujeres fallecidas, con una tasa de mortalidad de 1 por cada 100 mil mujeres, lo que representa un aumento de 85,7% respecto del año anterior. Entre 2021 y 2025, un total de 52 mujeres perdió la vida por esta enfermedad en la región.

Por rango etario, la mayor proporción de fallecimientos se concentró en mujeres entre 50 y 69 años, con 22 casos, seguida del grupo de 49 años o menos, con 15 muertes.

En esa línea, la Seremi de Salud de Arica y Parinacota, con base en el Informe del Registro Poblacional de Cáncer 2008-2018, señala que en mujeres los cánceres más frecuentes son mama, piel no melanoma y tráquea, bronquios y pulmón, con tasas de 45,4; 31,0 y 14,6 por 100 mil, respectivamente. El cáncer cervicouterino se ubica en cuarto lugar, con una tasa de 14,4.

En materia de prevención y detección precoz del

cáncer cervicouterino, en Chile niñas y niños de cuarto básico reciben de manera gratuita la vacuna contra el VPH, por lo que es clave verificar su aplicación durante la etapa escolar.

En cuanto al tamizaje, la autoridad sanitaria Karla Kepec, subrayó que mujeres y personas trans masculinas deben realizar controles según edad, con Papanicolaou cada tres años entre los 25 y 34 años y entre los 46 y 64, y prueba de VPH cada cinco años entre los 35 y 45. A ello se suma el derecho a medio día laboral anual para exámenes preventivos, incluido el PAP, establecido en el Código del Trabajo. 