

Alerta en la Región por aumento de casos de sífilis en embarazadas: existe riesgo de transmisión congénita

HOSPITAL HHA. La infección ha crecido un 23% en la última década, con focos en Temuco, Padre Las Casas y zona lacustre. Profesionales de la salud advierten los peligros para el bebé en gestación y destacan la importancia de la detección temprana para evitar consecuencias irreversibles.

El Austral
 carolina.torres@australtemuco.cl

Un silencioso pero preocupante aumento de casos de sífilis materna está encendiendo las alarmas en la Región de La Araucanía. La situación, que se ha mantenido en alza sostenida durante la última década, amenaza con derivar en sífilis congénita, una infección grave que afecta a recién nacidos y puede provocar consecuencias devastadoras como aborto espontáneo, muerte fetal, meningitis o daño hepático.

Según datos del Servicio de Salud Araucanía Sur, los casos de sífilis en la Región se han incrementado en un 23% en los últimos diez años, con un peak que supera los 35 casos anuales desde el año 2021, siendo Temuco, Padre Las Casas y sectores lacustres, los que lideran la lista de comunas más afectadas. “El crecimiento en casos se relaciona con factores psicosociales como consumo problemático de sustancias, itinerancia y una baja percepción de riesgo, principalmente en la población joven”, explica el doctor Fernando Abarzúa, médico obstetra del Hospital Dr. Hernán Hen-

“El riesgo no ha pasado. Mientras la sífilis siga aumentando en la población general, la sífilis congénita seguirá siendo una amenaza latente”.


Dr. Fernando Abarzúa
 médico obstetra Hospital HHA

riquez Aravena y encargado del Centro de Infecciones Perinatales (CIP).

SÍFILIS CONGÉNITA

La sífilis congénita ocurre cuando una madre infectada transmite la bacteria al feto, con consecuencias potencialmente graves para el recién nacido. Por eso, el aumento de sífilis en embarazadas representa un importante desafío para la salud pública local.

Desde el principal centro asistencial de la Región, advierten que, aunque la sífilis congénita ha sido contenida localmente, el riesgo sigue presente debido al aumento de la infección en la población general. “El riesgo no ha pasado. Mientras la sífilis siga aumentando en la población, la sífilis congénita seguirá siendo una amenaza la-



COMUNICACIONES HOSPITAL HHA

UN AUMENTO CONSTANTE DE CASOS DE SÍFILIS EN LA POBLACIÓN MATERNA SE HA OBSERVADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

tente”, enfatiza el doctor Abarzúa.

En medio de este complejo panorama, el rol del Centro de Infecciones Perinatales del Hospital Hernán Henríquez Aravena ha sido clave.

A través de un modelo de trabajo integral y colaborativo entre atención primaria, espe-

cialistas, matronas y neonatólogos, el CIP ha logrado evitar, hasta ahora, la aparición de casos de sífilis congénita dentro de su red asistencial.

“El riesgo sigue latente y la prevención debe fortalecerse continuamente para evitar que la sífilis materna se traduzca en nuevos casos congénitos”, ad-

vierte Edelweiss Valdebenito, referente de enfermedades emergentes del Servicio de Salud Araucanía Sur e integrante del CIP.

A su juicio, “el aumento de sífilis en la Región es un desafío que requiere una respuesta amplia y coordinada para evitar sífilis congénitas con consecuen-

¿Qué es la sífilis?

• La sífilis es una infección bacteriana de transmisión sexual (ITS) causada por la bacteria *Treponema pallidum*. Se transmite principalmente a través del contacto sexual con úlceras infecciosas presentes en genitales, ano, recto, labios o boca. La sífilis puede causar graves problemas de salud si no se trata, pero es curable con antibióticos. Según la OPS, el uso correcto y uniforme de preservativos reduce significativamente el riesgo de infección. La transmisión materno-infantil (sífilis congénita) es prevenible a través de la detección y el tratamiento oportuno de la sífilis en la embarazada.

cias irreversibles”, expresó Valdebenito, quien señala que el llamado es a no bajar la guardia y mantener la vigilancia estrecha, reforzando las campañas de educación sexual, promoción del autocuidado y el acceso a diagnóstico y tratamiento para proteger la salud de madres y recién nacidos. 