

Casos autóctonos de dengue aumentan a tres en Rapa Nui

BROTE. Se suman al importado que se detectó la semana pasada, mientras que hay otros cinco casos sospechosos a la espera de los resultados de exámenes.

Cristián Rojas M.
cristian.rojas@mercuriovalpo.cl

Preocupación existe en Rapa Nui ante la confirmación de tres casos autóctonos de dengue en la isla, esto es, que se contagiaron en dicho territorio, los que se suman al caso importado descubierto la semana pasada, cuyo contagio habría sido en Tahití; y a cinco casos sospechosos que están a la espera de los resultados de exámenes, por lo que se trata de un brote. Frente a la situación, Senapred recordó que se mantiene activa desde abril de 2024 una alerta temprana preventiva regional por alteración sanitaria.

Al respecto, el seremi de Salud (s), Carlos Zamora, señaló que las dos primeras personas confirmadas con dengue autóctono "se encuentran en buen estado de salud, en reposo domiciliario y bajo aislamiento vectorial. Hemos activado vigilancia epidemiológica y control vectorial en el sector".

El tercer caso se confirmó más tarde, y Zamora hizo un llamado "a la comunidad a estar atentos a síntomas como fiebre, dolor de cabeza o manchas en la piel, y a eliminar aguas estancadas para prevenir la proliferación del zancudo".

PREOCUPACIÓN

En tanto, el consejero regional por Rapa Nui, Francisco Haoa, expresó que en la isla "la preocupación siempre está porque el brote no aumente. En la isla las autoridades sanitarias ya tienen la *expertise*, yo creo que es el lugar de Chile donde hay más expertos en el tema del dengue. Muchas veces, más que el tratamiento médico, el trabajo tiene que enfocarse fuertemente en la difusión de la prevención



RAPA NUI SE ENCUENTRA BAJO ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA POR ALTERACIÓN SANITARIA DESDE 2024.

"Se encuentran en buen estado de salud (...). Hemos activado vigilancia epidemiológica y control vectorial en el sector".

Carlos Zamora
Seremi (s) de Salud

"La preocupación siempre está porque el brote no aumente. En la isla las autoridades sanitarias ya tienen la *expertise*".

Francisco Haoa
Core por Rapa Nui

"Las personas tienen que tratar de evitar tener agua apozada, por ejemplo, en un macetero, un tarro, un bidón, un neumático".

Rodrigo Cruz
Infectólogo, académico UV

del dengue. Y lo otro que corresponde fuertemente es mitigar las zonas de propagación del mosquito *Aedes aegypti*".

Agregó que aquello "requiere limpieza, y esa limpieza requiere de un trabajo de municipalidad, coordinado con ellos, y obviamente se necesitan recursos frescos para financiar, arrendar maquinaria, mano de obra para que rápidamente limpien, porque en la isla, por las lluvias, los sitios con plantas necesitan ser limpiados para fumigarse de forma eficiente. La preocupa-

ción es que esto no escale".

Por su parte, el médico infectólogo Rodrigo Cruz, académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso (UV), recordó que "no es primera vez que en la isla se presentan casos autóctonos de dengue. De hecho, la mayoría de los centros de investigación relacionados con el estudio del dengue en nuestro país van a Rapa Nui, porque justamente es el lugar donde tenemos, de partida, el vector circulando de forma permanente, aunque frecuentemente también hay un control; y por otra parte, cada cierto tiempo tenemos casos importados".

CONTROLAR EL VECTOR

No obstante, puntualizó que "en los últimos años se ha ido controlando bastante bien por parte de la autoridad sanitaria. El camino es ir a controlar el vector para poder controlar la transmisión de forma autóctona del dengue".

Cruz recomendó que "las personas tienen que tratar de

evitar tener agua apozada, como por ejemplo un macetero que pueda tener agua, un tarro, un bidón, un neumático que cuando llueve queda agua en el interior. Es importante tratar de evitarlo".

USO DE REPELENTE

A su vez, el presidente regional del Colegio Médico, Ignacio de la Torre, también recomendó "usar repelentes y ropa que nos proteja de la picada del mosquito, de tal manera de reducir las posibilidades y que la probabilidad de infección sea menor".

"Y cuando se generan estas alertas, siempre es importante que el personal sanitario sepa reconocer cuadros que potencialmente podrían corresponder a dengue, y en este caso, ya sea en su forma de fiebre hemorrágica o la forma no hemorrágica, es importante que el personal de salud esté atento y pueda tomar las medidas del caso para un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado", añadió. **CS**

Caso sospechoso de hanta en Limache

• Luego de que un hombre de 60 años se contagiara de hantavirus la semana pasada en Limache (quien falleció en el Hospital Biprovincial Quillota Petorca), ayer se informó de otro caso sospechoso de dicha enfermedad, esta vez una mujer de 46 años. Para prevenir contagios, Rodrigo Cruz, infectólogo de la UV, y el presidente regional del Colmed, Ignacio de la Torre, recomendaron entrar con mascarillas a espacios cerrados que podrían haber albergado ratones de cola larga, y ventilarlos como mínimo media hora antes de asearlos con un trapo húmedo o con una aspiradora.