

Vienes 27 de Marzo de 2026

El Longino DE ALTO HOSPICIO

Salud

7



Cáncer cervicouterino

El cáncer cervicouterino es un tumor maligno en la parte inferior del útero, generalmente causado por una infección persistente de tipos de alto riesgo del Virus del Papiloma Humano (VPH). Se desarrolla lentamente a lo largo de varios años, a menudo sin síntomas tempranos, y es altamente prevenible mediante la vacuna contra el VPH y controles ginecológicos regulares (PAP/Test VPH).

Aspectos Clave:

Causa principal: Infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH), transmitido por contacto sexual.

Prevención:


La vacuna contra el VPH (recomendada entre 9-26 años) y el tamizaje (PAP o test de VPH) son las mejores herramientas de prevención.

Síntomas avanzados:

Sangrado vaginal inusual (después de relaciones sexuales, entre menstruaciones), dolor pélvico o flujo con mal olor.

Factores de riesgo:

Inicio temprano de actividad sexual, múltiples parejas sexuales, tabaquismo y sistema inmunológico debilitado.



Tipos:

Carcinoma de células escamosas: El más común, comienza en la superficie externa del cuello uterino.

Adenocarcinoma:

Se origina en las células glandulares del canal cervical.

El tratamiento, que puede incluir cirugía, radioterapia o quimioterapia, depende del estadio del cáncer, siendo fundamental la detección oportuna en etapas precancerosas.