

Sarampión: Inquieta déficit de vacunación en Arica ante brote en Perú

● —————
Cobertura de segunda
dosis es de 77%, bajo
el 95% requerido.

DIANA VALDIVIA

La seremi de Salud de la Región de Arica y Parinacota, Karla Kepec, alertó sobre la deficitaria cobertura en esa zona fronteriza de la segunda dosis de la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotoditis) que se aplica a los niños de 3 años de edad. La situación preocupa dado el brote activo de sarampión en el sur de Perú, con 299 casos confirmados en la región de Puno, 360 km al norte.

“Se ha reforzado la vigilancia epidemiológica y la búsqueda activa en todos los centros de salud públicos y privados”, dijo Kopec, quien llamó a los padres a vacunar a sus niños, pues es “la mejor herramienta de protección” para toda la comunidad.

Prevenir brotes locales requiere una cobertura mínima del 95% de la citada dosis. Pero en los últimos tres años este indicador se ha mantenido bajo el 80%, cerrando 2025 con 76,8% de cobertura regional, lo que consolida una alta acumulación de niños y niñas susceptibles a contraer la enfermedad.

La alta conectividad transfronteriza y el constante flujo migratorio con Perú elevan el riesgo de importación de casos.