

Arica: casos de sífilis suben 10% y se concentran principalmente en la población joven adulta

Durante 2025, el mayor riesgo se concentró en el grupo de 25 a 29 años, con una tasa de 152,5 casos por cada cien mil habitantes.

Constanza Vergara Barreda
 constanza.vergara@estrellaarica.cl

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) han mostrado una tendencia al alza en Chile durante los últimos años. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, los casos de sífilis han aumentado especialmente en personas de entre 15 y 29 años, mientras que a nivel regional el comportamiento presenta diferencias en la distribución de los grupos etarios afectados.


Según antecedentes entregados por la Seremi de Salud de Arica y Parinacota, en los últimos tres años las mayores tasas de sífilis se han concentrado en la población joven adulta. En términos de casos, el año 2024 cerró con 168 diagnósticos en la región, mientras que en 2025 la cifra se elevó a 184 casos, lo que representa un incremento de veinte notificaciones respecto del período anterior; es decir, un 10% más.

Durante 2025, el grupo

etario con mayor riesgo correspondió a personas de entre 25 y 29 años, con una tasa de 152,5 casos por cada cien mil habitantes. Le siguieron los rangos de 20 a 24 años, con una tasa de 151,2, y de 30 a 34 años, con 141,1 por cien mil habitantes.

En contraste, durante 2024 el mayor riesgo se concentró en el grupo de 30 a 34 años, que registró una tasa de 159,1 por cien mil habitantes, seguido por el tramo de 25 a 29 años, con 156,5, y por personas de entre 40 y 44 años, con una tasa de 120,2. En tanto, en 2023 el grupo más afectado fue el de 25 a 29 años, con una tasa de 180,3 por cien mil habitantes, seguido por el rango de 30 a 34 años, con 177, y el de 20 a 24 años, con 162.

En ese contexto, las cifras acumuladas evidencian una prevalencia sostenida de los casos de sífilis en la población joven adulta de la región, especialmente en el tramo etario de 20 a 34 años.



EL NO USO SOSTENIDO DEL PRESERVATIVO FIGURA ENTRE LOS FACTORES ASOCIADOS A LA SÍFILIS.

Indicadores de la autoridad sanitaria regional muestran que el aumento de los casos de sífilis se relaciona con diversos factores. Entre ellos destacan el no uso sostenido del preservativo, el mayor número de parejas sexuales sin

protección, la baja percepción de riesgo y el acceso irregular a controles de salud sexual y testeo preventivo. También inciden el consumo de alcohol y drogas en contextos de relaciones sexuales, que favorecen conductas de mayor

exposición.

Desde un enfoque social, se identifican además factores como la migración y movilidad fronteriza, la baja adherencia a controles preventivos, la estigmatización asociada a las infecciones de transmisión

sional sexual y la desinformación en materias de sexualidad y autocuidado.

Frente a este panorama, la Seremi de Salud Arica y Parinacota reforzó las medidas de prevención. Entre ellas se incluyen la detección de sífilis en la atención primaria, con énfasis en mujeres embarazadas, la pesquisa precoz de casos y el estudio de contactos, junto con la capacitación de los equipos de salud y acciones de prevención combinada dirigidas a poblaciones clave.

Por ello, la autoridad sanitaria llamó a la comunidad a realizar el examen VDRL ante conductas sexuales de riesgo, acceder a testeo periódico incluso sin síntomas, mantener el uso correcto y sostenido del preservativo y consultar de manera oportuna ante la aparición de lesiones genitales, úlceras o exantemas.

De igual forma, se invitó a participar en instancias de educación sexual, que incluyen intervenciones en universidades, ferias comunitarias y espacios juveniles, así como el trabajo con organizaciones sociales y municipios para atender a la población joven migrante.