

Fecha: 27-04-2024
Medio: La Tribuna
Supl.: La Tribuna
Tipo: Noticia general
Título: Covid-19 concentra la mayor circulación en Biobío: Vacunación no supera el 20%

Pág.: 6
Cm2: 206,0
VPE: \$ 347.729

Tiraje: 3.600
Lectoría: 14.800
Favorabilidad: ☐ No Definida

Covid-19 concentra la mayor circulación en Biobío: Vacunación no supera el 20 %

En el caso particular de la campaña contra la influenza los porcentajes se elevan sobre el 75 % en personal de salud pública.



La Campaña de Invierno impulsada por el Ministerio de Salud ha registrado avances, así lo dejó en claro la Seremi de Salud del Biobío con una nueva actualización de cifras de cobertura local.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, en el caso de la vacuna-

ción contra el Covid-19 la región del Biobío cuenta con 513.978 personas habilitadas para vacunarse, de las cuales 72.707 ya están vacunadas. Esto corresponde a un 16,6 % de avance, subdividido entre funcionarios de la salud con 19,5 %, personas inmunocomprometidas con 3,7 %, pacientes crónicos con 10 %, embarazadas con 1,4 % y población de 60 años y más con 16,6 %.

Por su parte, la cober-

tura contra la influenza exhibe un avance del 36,7 % en relación a una población objetivo que llega a las 811.709 personas. Actualmente, los grupos que lideran la vacunación corresponden a personal de salud pública (75 %), personal de salud privado (61,7 %) y establecimientos de larga estadía (53,7 %).

"El llamado es a que otros grupos objetivo de la campaña accedan a esta importante protección en salud en la red asistencial, como son los niños de 6 meses a 5 años, escolares de 6 a 10 años, embarazadas y las per-

sonas de 60 años y más, principalmente", declaró el seremi de Salud, Dr. Eduardo Barra.

En cuanto al actual panorama de circulación viral, de acuerdo con el boletín informativo de la semana epidemiológica 16, correspondiente al 20 de abril de 2024, los virus de mayor circulación corresponden al Covid-19 (48,9 %), seguido por Rinovirus (24,2 %) e Influenza A (13,2 %). En menor proporción, también están presentes en orden decreciente, casos de Parainfluenza, Metapneumovirus, Influenza B y Virus Respiratorio Sincial.