

Fecha: 12-04-2026
 Medio: El Austral de la Araucanía
 Supl.: El Austral de la Araucanía
 Tipo: Noticia general
 Título: 34 Mujeres habrían fallecido por cáncer cervicouterino

Pág.: 7
 Cm2: 459,9
 VPE: \$ 714.718

Tiraje: 8.000
 Lectoría: 16.000
 Favorabilidad: ☐ No Definida

34 mujeres habrían fallecido por cáncer cervicouterino

EN LA REGIÓN. Entre 2021 y 2025, la cifra se eleva a 197.

El Austral
 cronica@australtemuco.cl

El cáncer cervicouterino sigue siendo uno de los principales cánceres que afectan a las mujeres en edad sexualmente activa en Chile. Cada año, más de mil pacientes son diagnosticados con esta enfermedad y durante 2025, 681 mujeres habrían fallecido por cáncer cervicouterino en Chile, una de las cifras más altas registradas en los últimos años, según datos preliminares del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud. En la Región de La Araucanía esta cifra llega a 34 mujeres fallecidas, un 19% menos que el año anterior.

Entre 2021 y 2025, 197 mujeres perdieron la vida por esta enfermedad en la región. En cuanto a los rangos etarios, la mayor proporción de fallecimientos en este periodo se concentró en mujeres entre 70 a 89 años, con 72 casos, seguido por el grupo de 50 a 69 años, con 63 muertes.

DESARROLLO

La enfermedad se origina en las células del cuello uterino. El cuello del útero es la parte inferior de este órgano que conecta con la vagina. Más del 95% de los cánceres cervicouterinos son producidos por el Virus del Papiloma Humano (VPH), específicamente por los tipos 16 y 18, que se transmiten principalmente por contacto de piel a piel.

"El cáncer cervicouterino es conocido como un enemigo silencioso porque en sus fases iniciales suele ser totalmente asintomático. Por eso, las pruebas de tamizaje o de rutina son vitales. Sin embargo, se debe poner atención ante el sangrado vaginal anormal, el cambio de flujo vaginal, dolor abdominal, molestias durante las relaciones sexuales o sangrado después de la menopausia", explica la doctora María Eugenia Giavedoni, gineco-oncóloga de FALP.

"Afortunadamente este cáncer es uno de los más prevenibles y tratables si se detecta a tiempo".

María Eugenia Giavedoni,
 gineco-oncóloga de FALP

munización (PNI) y consta de la administración de una dosis a niñas y niños de 9 años. Para personas mayores de edad, la vacuna está disponible de manera particular.

Además, mantener los controles preventivos al día es fundamental para detectar precozmente el cáncer cervicouterino. Por eso, la Ley 20.769 da derecho a las mujeres a medio día administrativo para realizarse exámenes preventivos, como el PAP o el Test de VPH, mientras que el Examen de Medicina Preventiva del Adulto (EMPA) garantiza a todas las mujeres entre los 25 y 64 años el acceso a PAP gratuito cada tres años, tanto en



MANTENER LOS CONTROLES PREVENTIVOS AL DÍA ES FUNDAMENTAL PARA DETECTAR PRECOZMENTE EL CÁNCER.

el sistema público como para beneficiarias de isapres.

"El PAP detecta cambios o lesiones en las células del cuello del útero, mientras que el test del Virus del Papiloma Humano, o PCR, busca la presencia de virus que causan esos cambios", agrega la gineco-oncóloga.

ga. "Este cáncer es uno de los más prevenibles y tratables si se detecta a tiempo. Las medidas concretas que marcan la diferencia son la vacunación contra el virus, el tamizaje o control de rutina con papanicolaou o el Test del Virus Papiloma y el uso de preservativo", detalla.



JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026
10:00 HORAS
 Auditorio Centro Cultural de Lautaro
 Manuel Matta #975

¿Qué LAU está pasando en TA RO?


Ricardo Jaramillo
 Alcalde de Lautaro


María Elena Fuentes
 Rectora CFT de La Araucanía


Carlos Gutiérrez
 Presidente Corporación Araucanía


José Miguel Martabid
 Presidente Parque Industrial y Tecnológico

MODERA
 Mauricio Rivas
 Director Diario El Austral

Cupos limitados

Más información e inscripciones:
encuentroscorporacionaraucania.cl

corporacionaraucania.cl

CONTROLES PREVENTIVOS

El cáncer cervicouterino es prevenible. Existe una vacuna contra las cepas de VPH de mayor riesgo cancerígeno. En Chile, es parte del Plan Nacional de In-

SOCIOS COLABORADORES

