LITORALPRESS

Fecha: 28-04-2023
Medio: El Austral de la Araucanía
Supl. : El Austral de la Araucanía
Tipo: Noticia general
Título: A más de dos mil aumentan las aves de corral sacrificadas por la gripe aviar

Pág. : 5
Cm2: 439,6
VPE: $ 683.157

Tiraje: 8.000
Lectoría: 16.000
Favorabilidad: No Definida

A más de dos mil aumentan las aves de corral sacrificadas por la gripe aviar

LA REGIÓN. *Son un total de 11 las comunas más afectadas por focos de esta enfermedad en aves de traspatio. Especialista de la U. Mayor llama a evitar el contacto con animales infectados y recomienda vacunarse para prevenir.*

AGENCIA UNO

UN TOTAL DE 2 MIL 232 AVES DE CORRAL HAN SIDO SACRIFICADAS HASTA LA FECHA EN LA REGIÓN DEBIDO AL AVANCE DE LA INFLUENZA AVIAR.

Carolina Torres Moraga
carolina.torres@australtemuco.cl

A 2 mil 232 aumentó el número de aves de corral sacrificadas debido al contagio con la peligrosa influenza aviar, que mantiene focos importantes en un total de 11 comunas en la Región.

Según la información actualizada entregada por el Servicio Agrícola Ganadero, SAG, de La Araucanía, las comunas donde actualmente existen focos activos son Purén, Los Sauces, Traiguén y Victoria; en Malleco; y Nueva Imperial, Galvarino, Lautaro, Carahue, Perquenco, Villarrica y Toltén, en la provincia de Cautín.

Los principales síntomas de las aves infectadas son falta de apetito y descoordinación, plumaje erizado, respiración dificultosa con secreciones nasales, diarrea, menor producción de huevos, con cáscara blanda o deforme, hinchazón de cabeza y color azulado de cresta, barbillas y patas. Finalmente postración y muerte.

Al advertir síntomas en las aves de corral, el principal llamado del SAG es a no tocarlas y mucho menos si es que están muertas. Lo que se debe hacer es reportar la situación a la oficina del SAG más cercana, llamar al call center 22345 1100, o bien escribir al correo: oficina.informaciones@sag.gob.cl.

Asimismo, el llamado a quienes tengan aves de traspatio es a que las mantengan encerradas y bajo techo y, si alguna de éstas presenta síntomas, reportarlo de inmediato al SAG.

> “Se recomienda aún más la vacunación por la prevención de exponerse en forma simultánea a la infección por virus influenza humana y aviar”.
>
> **Dra. Carla Concha, infectóloga y académica U. Mayor Temuco**

EN HUMANOS

En el caso de los seres humanos, el principal riesgo de transmisión es tener contacto directo y sin protección con aves o animales infectados. Así lo manifiesta la médico infectóloga y académica de la carrera de Medicina de la Universidad Mayor Sede Temuco, doctora Carla Concha, quien señala que si bien “existen casos descritos de posible transmisión entre humanos, no es el principal mecanismo de transmisión”, siendo efectivamente el principal el tener contacto con aves silvestres o domésticas que parecen estar enfermas.

A juicio de la especialista, considerando la actual situación, cobra mayor relevancia acceder a la vacunación contra la influenza, pese que a que “la vacuna de influenza estacional no protege de manera directa contra la infección por gripe aviar”.

Sin embargo, -explica- “se recomienda aún más las vacunación por la prevención de exponerse de manera simultánea a la infección por virus influenza humana y aviar, lo que podría ser de mucha mortalidad”.

En tanto, desde el Minsal se ha informado que la influenza aviar no se contagia por el consumo de alimentos, carnes blancas o huevos. “Ahora bien, se recomienda su consumo bien cocido, con una correcta manipulación (lavado de manos, utensilios y evitar la contaminación cruzada) y evitar el consumo de animales enfermos o que hayan muerto de manera repentina”, señalan.

Sintomatología en seres humanos

- Según lo explicado por la académica de U. Mayor, “las personas infectadas por esta influenza podrían no presentar síntomas o que éstos sean leves como conjuntivitis, fiebre, dolor muscular, congestión nasal o dolor de cabeza. Y, también, podrían sufrir de molestias más graves como dificultad para respirar, requiriendo hospitalización en los casos de neumonia, que se describe con una muy alta probabilidad de requerir apoyo con ventilación mecánica o fallecer”, detalló la doctora Concha.