



Circulación.
 Los especialistas señalan que en agosto podría ocurrir el alza viral a raíz de un *peak* más tardío.

Temperaturas más altas, entre factores: *Ad portas de que cierre julio,* aún no se registra *peak* de urgencias respiratorias

Expertos advierten que en agosto, un mes que usualmente no es considerado crítico, podría producirse el alza en estas atenciones.

JUDITH HERRERA C.

Julio se va, pero los indicadores de circulación viral y hospitalizaciones por enfermedades respiratorias todavía no alcanzan su punto más alto. Si bien se han registrado alzas sostenidas en la última quincena, los datos de vigilancia epidemiológica muestran que el *peak* aún no se concreta este invierno.

En los hospitales públicos y clínicas privadas, las atenciones respiratorias han aumentado, pero se mantienen por debajo de los niveles críticos.

La menor intensidad del brote hasta este momento podría explicarse por distintos factores, como los efectos del clima o los cambios en la exposición viral.

Sin embargo, la preocupación se mantiene, ya que el desplazamiento del *peak* podría generar un impacto más tardío, coincidiendo con la última fase del invierno. De hecho, hace unos días, el Ministerio de Salud advertía que en las próximas semanas podría haber un alza de hospitalizaciones.

Daniel Skorka, director de Medicina de la U. Central, plantea sobre el retraso en el *peak* que puede deberse "a que hemos tenido un otoño e incluso invierno mucho más cálido, con menor circulación también escolar, dado que se adelantaron las vacaciones y también en que ha habido algunos cambios en los patrones estacionales pospandemia".

El académico afirma que un invierno

más cálido "favorece que haya una menor tasa de transmisión de enfermedades propias del invierno. No obstante, también tiene algunos riesgos, como, por ejemplo, bajar las tasas de vacunación o presentar estas infecciones en otros momentos del año".

Con todo, señala que "una de las consecuencias que puede tener el desplazamiento del *peak* hacia agosto es que podría coincidir con una menor disponibilidad de camas UCI, dado que en estas épocas aumentan las cirugías que están resolviéndose en listas de espera o complicaciones de otra índole".

Para David Torres, docente de Salud Pública de la U. de los Andes, "si el *peak* viral se trasladara a agosto, algo que no se puede predecir con certeza, podría generar una saturación del sistema en un mes que usualmente no es considerado crítico, como sí lo son junio o julio".

"Podría subir la presión sobre camas UCI, camas pediátricas y otros servicios hospitalarios, afectando también procedimientos programados como cirugías o tratamientos específicos", advierte.

"Todavía es muy precoz para decir que no vamos a tener un segundo *peak* de consultas respiratorias o si van a ser menores que en los años previos, pero llama la atención que podría ser más bien tardío", plantea Allan Mix, director del Programa de Especialidad en Medicina de Urgencia de la U. Diego Portales.

LLUVIAS
 Este julio ha sido el segundo más seco desde que hay registro en la capital, aunque hoy habría chubascos.