

Fecha: 18-06-2025
 Medio: La Estrella de Arica
 Supl.: La Estrella de Arica
 Tipo: Noticia general
 Título: El síndrome de Down conduce a un mayor riesgo de Alzheimer

Pág.: 14
 Cm2: 185,1

Tiraje: 7.300
 Lectoría: 21.900
 Favorabilidad: ☐ No Definida



LA DEGENERACIÓN DEL LÓBULO TEMPORAL MEDIAL SERÍA UNA CAUSA.

El síndrome de Down conduce a un mayor riesgo de Alzheimer

Un estudio liderado por el Instituto barcelonés de Investigación Sant Pau (España) en personas con síndrome de Down revela que la pérdida de volumen y de grosor cortical en partes del cerebro pueden comenzar entre 13 y 15 años antes del inicio de los síntomas del Alzheimer.

El trabajo se basa en una amplia cohorte de 259 adultos con síndrome de

Down y 138 personas sin él, todos ellos evaluados mediante resonancia magnética de alta resolución, análisis de biomarcadores en líquido cefalorraquídeo y una caracterización clínica y neuropsicológica detallada.

Los investigadores han mapeado de forma sistemática la trayectoria de las subregiones del lóbulo temporal medial (LTM) en

relación con el deterioro cognitivo y los marcadores biológicos de la enfermedad.

El estudio ha demostrado que la atrofia en regiones del LTM comienza entre 13 y 15 años antes de los primeros síntomas del Alzheimer en personas con síndrome de Down.

Las personas con este síndrome tienen una predisposición genética única:

la sobreexpresión del gen APP debido a la triplicación del cromosoma 21 conduce a una sobreproducción de proteína beta-amiloide (Aβ), lo que las convierte en un modelo genético natural del Alzheimer.

Así, las estimaciones apuntan que más del 90% de la población con síndrome de Down desarrollará esta enfermedad en su vida. 🧠