

Fecha: 16-07-2025  
 Medio: La Estrella de Chiloé  
 Supl.: La Estrella de Chiloé  
 Tipo: Noticia general  
 Título: Los síntomas premenstruales elevan 31% el riesgo de arritmia en mujeres

Pág.: 15  
 Cm2: 471,9  
 VPE: \$ 291.132

Tiraje: 2.800  
 Lectoría: 8.400  
 Favorabilidad: ☐ No Definida

# Los síntomas premenstruales elevan 31% el riesgo de arritmia en mujeres

Malestares previos al periodo suben 10 por ciento el peligro de sufrir patologías cardíacas, concluyó estudio a 99.000 féminas.

Agencia EFE  
 Medios Regionales

**L**as mujeres diagnosticadas con síntomas premenstruales tienen un 10% más de riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, 31% más de padecer arritmias y un 27% más de sufrir accidentes cerebrovasculares causados por coágulos sanguíneos, de acuerdo a un estudio del Instituto Karolinska, en Suecia, publicado en la revista Nature.

Los síntomas premenstruales incluyen el síndrome premenstrual (SPM) y su forma más grave, el trastorno disfórico premenstrual (TDPM). En ambos casos, los síntomas, que aparecen unos días antes de la menstruación y luego desaparecen, pueden ser tanto psicológicos como físicos.

Los científicos siguieron a 99.000 mujeres con SPM durante hasta 22 años y compararon su salud con la de mujeres sin estos síntomas, tanto en la población general como con sus propias hermanas para tener en cuenta los factores hereditarios y la educación.

Los resultados arrojaron que las mujeres con síntomas premenstruales tenían un riesgo un 10%



LAS PARTICIPANTES DEL ANÁLISIS REPORTARON SU ESTADO DE SALUD DURANTE MÁS DE 20 AÑOS.

mayor de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

Al analizar diferentes tipos de enfermedades cardiovasculares, descubrieron que la relación era especialmente fuerte en el caso de los trastornos del ritmo cardíaco (arritmias), donde el riesgo era un 31% mayor, y en el de los accidentes cerebrovasculares causados por coágulos sanguíneos, donde el riesgo era un 27% más alto.

Incluso después de tener en cuenta otros factores como el tabaquismo, el índice de masa corporal y la salud mental, la relación entre los síntomas premenstruales y el aumento del riesgo de enfermedad se mantenía.

"El aumento del riesgo era especialmente evidente en las mujeres diagnosticadas antes de los 25 años y en aquellas que también habían sufrido depresión

posparto, una afección que también puede estar causada por fluctuaciones hormonales", dijo una de las autoras del estudio, Yihui Yang, máster en Salud Pública y estudiante de doctorado.

## POSIBLES EXPLICACIONES

Las investigaciones aún no han identificado la causa de esta relación, pero sugirieron tres posibles explicaciones: la primera es que

las mujeres con síntomas premenstruales pueden tener una regulación alterada del sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAAS), que controla la presión arterial y el equilibrio de líquidos en el cuerpo, entre otras cosas.

La segunda es que estas mujeres tienen niveles elevados de inflamación corporal, lo que es un factor de riesgo conocido para la aterosclerosis y otros proble-

**“**Aumento del riesgo era especialmente evidente en diagnosticadas antes de los 25 años y en aquellas que también habían sufrido depresión posparto”.

Yihui Yang, investigadora del Instituto Karolinska en Suecia.

mas cardíacos.

La última explicación podría ser que las que padecen síntomas premenstruales pueden tener anomalías metabólicas, las cuales están relacionadas con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular y ataque cardíaco.

"Esperamos que nuestros hallazgos contribuyan a una mayor concientización de que los trastornos premenstruales no solamente afectan a la vida diaria, sino que también pueden tener consecuencias para la salud a largo plazo", explicó otro de los autores de la publicación, Donghao Lu, doctor en Epidemiología. 🌐