



Santiago tendrá cortes de tránsito por cumbre internacional "Democracia Siempre"

INIA La Platina publicó una nueva ficha información detallada sobre el ciclo biológico técnica sobre la mosquita blanca de los del insecto, los daños que provoca y su invernaderos (Trialeurodes manejo integrado. El principal impacto es vaporariorum), una plaga polífaga de amplia indirecto: la secreción de mielecilla sobre la distribución mundial que afecta a más de 250 que se desarrolla fumagina, un hongo que especies vegetales, incluyendo cultivos debilita la planta y reduce el rendimiento. agrícolas, frutales, flores ornamentales y Entre las estrategias de manejo se malezas. En Chile, su presencia se ha recomienda el uso de trampas amarillas reportado desde Arica y Parinacota hasta desde la etapa de almacigo, instalación de Magallanes e incluso en Rapa Nui, afectando mallas antiáfidos en invernaderos, cultivos como pimiento, tomate, lechuga, eliminación de restos vegetales y monitoreo melón, poroto, zapallo, alfalfa, palto, kiwi, constante, especialmente en hojas nuevas. vides y diversas especies florales. También se Además, se destacan métodos de control desarrolla sobre malezas como malva y biológico mediante el uso del parasitoide Encarsia formosa, ampliamente disponible alta incidencia en distintos sistemas en empresas nacionales como Koppert, productivos. ControlBest y BioBee, junto a otros La ficha, elaborada por Nancy Vitta y Virginia controladores como Orius insidiosus y Aguilar de INIA La Platina, entrega Chrysoperla defreitasi.