

Brote de sarampión en Perú enciende alerta en regiones del norte del país

SALUD. Seremi llamó a padres de niños de 12 y 36 meses no vacunados a acudir consultorios a inocularse.

Constanza Caldera Pfeiffer
cronica@mercurioantofagasta.cl

El brote de sarampión que enfrenta Perú, que llevó al gobierno a decretar emergencia sanitaria en ciudades como Lima, Callao y Tacna, encendió las alertas sobre el eventual riesgo que esto significa para Chile, dada su cercanía con las regiones del norte.

Esto, considerando factores, como el tránsito de chilenos desde el norte del país hacia estas ciudades de Perú, como también el flujo migratorio presente en esta zona limítrofe de Chile.

Si bien en nuestro país, esta enfermedad está erradicada y su vacuna es parte del Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, en los últimos años se han presentado algunos casos importados, por parte de chilenos que han viajado a otros países.

SEREMI DE SALUD

Sobre el tema, el seremi de Salud, Rodrigo Medina, recordó que el sarampión es una enfermedad que en nuestro país se considera eliminada desde el año 1993.

"No obstante eso, sabemos de los brotes que se están produciendo en otros países del continente, por lo que como ministerio hemos hecho un llamado a los padres de los menores de 12 y 36 meses que no han sido vacunados, para que acudan con sus hijos a los consul-



FIEBRE ALTA, TOS Y MANCHAS EN LA PIEL, ENTRE SÍNTOMAS DEL SARAMPIÓN.

torios más cercanos a sus domicilios y reciban la inmunización", declaró.

De acuerdo a cifras del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, la cobertura de vacunación contra Sarampión, Rubéola y Parotiditis (SRP) en la población lactante fue del 93% para la primera dosis y de un 75% para la segunda dosis durante el 2025.

Medina recordó que el Minsal mantiene vigente el llamado a las personas nacidas entre 1971 y 1981, que van a viajar a un país que exija la vacuna, para que se acerquen a los vacunatorios y obtengan su dosis de

"Hemos hecho un llamado a los padres de los menores de 12 y 36 meses que no han sido vacunados, para que acudan con sus hijos a los consultorios".

Rodrigo Medina
Seremi de Salud

manera gratuita.

SÍNTOMAS

Sobre el sarampión, el seremi de Salud, explicó que se trata de una enfermedad que se transmite por contacto directo por gotitas de secreciones na-

"El brote de sarampión en el sur de Perú es un riesgo sanitario para el norte de Chile, ya que el tránsito entre ciudades como Arica y Tacna es alto".

David Torres
académico UANDES

sofaringeas infectadas o más raramente, por diseminación aérea.

Dentro de sus manifestaciones clínicas están la fiebre alta, tos, rinorrea, conjuntivitis y más tarde, un exantema maculopapuloso que dura 4 a 7 días.

MAYOR RIESGO SANITARIO

El académico del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Los Andes, David Torres, observa que "el brote de sarampión en el sur de Perú es un riesgo sanitario para el norte de Chile, ya que el tránsito entre ciudades como Arica y Tacna es alto, además que en esa zona hay mucha movilidad migratoria y turística".

"El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen, y aunque Chile haya erradicado el sarampión, esto significa solo que erradicó la circulación endémica, pero seguimos expuestos a casos importados de otros paí-

93% de cobertura
alcanzada en la primera dosis contra el sarampión en la región el 2025.

75% de cobertura
alcanzada en la segunda dosis de la vacuna durante el 2025, que equivale a 5.589 vacunados.

ses, y el principal problema es para las personas que son susceptibles a contagiarse, especialmente las no vacunadas o que tienen esquemas incompletos", indicó.

En este sentido, Torres, destaca que lo principal es revisar el estado de vacunación sobre todo en el caso de los niños, adultos mayores y personas que viajan frecuentemente al extranjero.

Asimismo, consultar precozmente al presentar síntomas como fiebre con manchas en la piel y respiratorios, "ya que eso permitirá aislarlos y evitar que la enfermedad se siga diseminando, si es que llega a contagiarse alguien en nuestro país", destacó Torres.

"Siempre la mejor defensa es mantener altas coberturas de vacunación y la vigilancia epidemiológica activa, que permite identificar precozmente la aparición de casos, y tomar las medidas de aislamiento necesarias", enfatizó. 