

Fecha: 25-02-2026
Medio: El Heraldo Austral
Supl.: El Heraldo Austral
Tipo: Noticia general

Pág.: 3
Cm2: 304,9

Tiraje: 1.500
Lectoría: 4.500
Favorabilidad: ☐ No Definida

Título: **Confirman hallazgo de murciélago con virus de la rabia en Frutillar**

Confirman hallazgo de murciélago con virus de la rabia en Frutillar

En el marco del Programa de Vigilancia de Rabia del Instituto de Salud Pública (ISP), durante este martes la jefa del departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud, Sofía Torres, confirmó el hallazgo de un murciélago que dio positivo al virus de la Rabia, el cual fue hallado en la Av. Philippi de Frutillar Bajo, a plena luz de día. La autoridad sanitaria confirmó la activación del protocolo sanitario y la realización de un operativo de vacunación preventiva en las residencias del sector.

“Debemos hacer una intervención educativa a la población cercana, en las viviendas, con las familias y verificar que las mascotas estén vacunadas. Si no lo están, nosotros mismos podemos hacer la vacunación”, sostuvo Torres.

Además, la jefa afirmó que entregarán información para aprender a manipular a estos animales en caso de sospecha de ser portador del virus. “Suelen tener un comportamiento errático, se pueden ver en el día, por ejemplo, algo que es inusual para este animal”, agregó.

En esa misma línea, la autoridad sanitaria destacó que “la idea es que la gente los pueda capturar con mucho cuidado y dar aviso a la Seremi de Salud para que nosotros podamos enviarlos al Instituto de Salud Pública para su análisis”. De igual manera, Torres subrayó la importancia de evitar el contacto directo con el murciélago, priorizando la utilización de guantes o bolsas para interactuar con el animal y capturarlos en algún recipiente o caja.



Este es el ejemplar con rabia encontrado en Frutillar Bajo.

¿Qué es la Rabia?

Según información publicada por el ISP, la Rabia es una enfermedad transmitida de animal a humano que produce una inflamación

aguda del cerebro (encefalitis), la cual es progresiva y mortal. La transmisión del virus rábico se produce a través de la saliva de un animal infectado, usualmente por mordeduras o rasguño.