

Fecha: 22-05-2026

Medio: La Estrella de Arica

Supl.: La Estrella de Arica

Tipo: Noticia general

Título: Preocupa cobertura insuficiente en la región contra el sarampión

Pág.: 5

Cm2: 421,2

Tiraje:

Lectoría:

Favorabilidad:

7.300

21.900

☐ No Definida

Preocupa cobertura insuficiente en la región contra el sarampión

Seremi de Salud explicó que se requiere cobertura mínima del 95% para prevenir brotes, y el 2025 se cerró con un 76,8% en Arica y Parinacota. Situación cobra especial relevancia ante alerta decretada en Perú.

Maria José Collado Rojas
mariajose.collado@estrellaarica.cl

La Seremi de Salud declaró que la cobertura de la segunda dosis de la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotoditis) a los 36 meses de edad en la región se encuentra en niveles de alto riesgo, ya que para prevenir brotes, se requiere una cobertura mínima del 95%. Sin embargo, durante los últimos tres años este indicador se ha mantenido bajo el 80%, cerrando el 2025 con 76,8% de cobertura regional, lo que consolida una alta acumulación de niños y niñas susceptibles a contraer la enfermedad.

Esto cobra especial énfasis, ya que durante 2026, la Región de las Américas ha registrado un aumento crítico de sarampión, con más de 18.000 casos confirmados que afectan principalmente a la población infantil y a personas no vacunadas. Existe especial preocupación por el brote activo en el sur de Perú, específicamente en la región de Puno, que acumulaba 299 casos confirmados hasta el martes. La alta co-



LA VACUNACIÓN TAMBIÉN DEBE REFORZARSE EN ADULTOS NACIDOS ENTRE 1971 Y 1981 QUE NO CUENTEN CON EL ESQUEMA COMPLETO.

nectividad transfronteriza y el constante flujo migratorio hacia el sur peruano elevan significativamente el riesgo de importación de casos a Arica y Parinacota.

Al respecto, la seremi de Salud, Karla Kepec, sostuvo que ante la alerta de sarampión decretada en Perú, se ha reforzado la vigilancia epidemiológica y la búsqueda activa en todos los centros de salud, tanto en

la red pública como privada. Además, se ha intensificado la vacunación en puntos de la región, la recomendación a viajeros y la educación comunitaria sobre sintomatología y medidas de prevención.

“En Chile, el sarampión es de notificación obligatoria e inmediata, por lo que, si alguien presenta síntomas como fiebre, manchas en la piel, tos o secreción

ocular, es importante que consulte de inmediato en su centro de salud”, dijo.

La autoridad sanitaria agregó que el sarampión es una enfermedad muy contagiosa, pero a la vez es inmunoprevenible. “La vacuna es la mejor herramienta de protección. Sin embargo, sólo el 77% de niños y niñas de 3 años han recibido la segunda dosis, cuando necesitamos

llegar al 95% para proteger a toda la comunidad, por eso es importante que se pongan al día. Vacunarse es protegernos y cuidar a todos nuestros seres queridos”.

ACCIONES

IMPLEMENTADAS

Desde la Seremi de Salud detallaron que existen varias medidas que se han desarrollado con el fin de

actuar frente a esta alerta. La primera de ellas, es el refuerzo de inmunización con intensificación de la vacunación programática SRP en el calendario regular (12 y 36 meses de edad).

Del mismo modo, se han entregado recomendaciones a viajeros al extranjero para vacunarse al menos 15 días antes de la salida, enfocada en menores y adultos nacidos entre 1971 y 1981 que no cuenten con esquema completo.

En el ámbito de la vigilancia epidemiológica, existe una difusión activa de la definición de “caso sospechoso” a los equipos médicos de la red asistencial pública y privada para una captación oportuna; así como una instrucción obligatoria de notificación inmediata ante todo caso sospechoso a la Seremi de Salud y activación de protocolos de aislamiento inmediato.

Finalmente, se ha difundido masivamente a la población sobre la sintomatología característica del sarampión y la importancia de la vacunación oportuna en menores de edad.