

Fecha: 05-04-2026
Medio: El Sur
Supl.: El Sur
Tipo: Noticia general
Título: Muertes por cáncer cervicouterino se concentran entre los 50 y 69 años

Pág.: 6
Cm2: 727,6

Tiraje: 10.000
Lectoría: 30.000
Favorabilidad: ☐ No Definida

Según datos del DEIS acumulados entre el 2021 y 2025 en la Región del Biobío

Muertes por cáncer cervicouterino se concentran entre los 50 y 69 años

Por Karlyng Silva Leal
karlyng.silva@diarielsur.cl

Desde la Fundación Arturo López Pérez recomiendan la realización de controles preventivos, pues es el tipo de cáncer que más afecta a mujeres en edad sexualmente activa.

Pese a los avances en medicina a través de programas de inmunización para prevenir las cepas del Virus del Papiloma Humano con mayor riesgo de desarrollo cancerígeno, la mayor acción preventiva es el diagnóstico temprano del cáncer cervicouterino a través de controles periódicos y atención a síntomas que, usualmente, pasan desapercibidos, ya que puede tardar entre 5 a 20 años en desarrollarse según el sistema inmune de los pacientes.

Así lo indicaron desde la Fundación Arturo López Pérez en el marco del Día Mundial del Cáncer Cervicouterino que se conmemora cada 26 de marzo, enfatizando que este tipo de cáncer es uno de los que más afecta a las mujeres en edad sexualmente activa en Chile, y que en la Región del Biobío concentra su mortalidad entre los 50 y 89 años.

Según cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, en la Región del Biobío fallecieron 48 mujeres durante el año 2025, lo que representa un 27,3% menos que las víctimas fatales provocadas por esta enfermedad durante el año 2024.

Así mismo, los datos del DEIS dan cuenta de que entre el 2021 y el 2025 esta enfermedad provocó la muerte de 313 mujeres en Biobío. Durante ese periodo, la mayor concentración de decesos que generó en los rangos etarios de los 50 y 69 años, con 118 casos (37,7%), seguido del grupo de los 70 a 89 años con 96 fallecimientos (30,6%).

PREVALENCIA

El cáncer cervicouterino se origina en las células del cuello uterino y el 95% de los casos son producidos por el Virus del Papiloma Humano (VPH), específicamente por los tipos 16 y 18 que se transmiten en su mayoría por contacto piel a piel. Por esto se estima que el 80% de las personas sexualmente activas, independiente de su orientación sexual, tendrá en algún momento de su vida la infección por VPH, aunque entre el 80% y 90% la elimina de manera natural por acción del sistema inmune.

Es por esto que las medidas de prevención son la principal recomendación del personal médico, sobre todo porque el cáncer cer-



Se estima que el 80% de las personas, independiente de su orientación sexual, podría contraer la infección del VPH a lo largo de su vida.

El cáncer cervicouterino es principalmente causado por el Virus del Papiloma Humano, en particular las cepas 16 y 18, para las cuales existe un plan de vacunación

vicouterino no presenta síntomas claros o específicos, siendo usualmente asintomático en sus fases iniciales, comenzando a aparecer las señales a medida que la enfermedad progresa, como lo son en la etapa metastásica los síntomas de dolor pélvico y en las piernas, pérdida de peso inexplicable y fatiga constante.

Así lo indicó la doctora María Eugenia Giavedoni, gineco-oncóloga de la fundación, quien explicó que "por eso las pruebas de tamizaje o de rutina son vitales. Sin embargo, se debe poner atención ante el sangrado vaginal anormal, el cambio de flujo vaginal, dolor abdominal, molestias durante las relaciones sexuales o sangrado después de la menopausia".

CONTROLES PREVENTIVOS

Ya que el VPH es una de las principales causas del cáncer cervicouterino, en el Plan Nacional

• PAP y Test de VPH

El PAP es un examen que detecta cambios o lesiones en las células del cuello del útero y el test de VPH busca la presencia del virus que causa esos cambios.

48

mujeres fallecieron en la Región del Biobío a causa del cáncer cervicouterino, sumando 313 en los últimos 5 años

de Inmunización está considerada la vacuna para las cepas de mayor riesgo. Esta consta de la administración de una dosis a niñas y niños de 9 años, mientras que para las personas mayores de edad esta vacuna está disponible de manera particular en cualquier vacunatorio del país.

"Afortunadamente este cáncer es uno de los más prevenibles y tratables si se detecta a tiempo. Las medidas concretas que marcan la diferencia son la vacuna-

ción contra el virus, el tamizaje o control de rutina con papanicolaou o el Test del Virus Papiloma y el uso de preservativo. También es importante evitar y dejar el tabaco", agregó la gineco-oncóloga.

Sobre la vacunación, destacó que se trata de una de las intervenciones de salud pública más potentes para reducir la carga de enfermedades oncológicas y está diseñada para entrenar al sistema inmunitario antes de que ocurra la exposición real al virus.