

EN POCO MÁS D

¿Desaparecen las cae cerca de la m

Cerca de 80 hectáreas destinadas al cultivo de papayos se han perdido desde 2011, según datos del INIA Intihuasi. El cambio en el uso de suelo y la menor disponibilidad hídrica explican esta disminución, que afecta principalmente a La Serena.



FRANCO RIVEROS B. / Región de Coquimbo

La superficie cultivada de papayos en la Región de Coquimbo ha registrado una significativa disminución en los últimos años, reflejando una tendencia que preocupa al sector agrícola local. De acuerdo con datos entregados por el investigador de INIA Intihuasi, Giovanni Lobos, las hectáreas plantadas han bajado desde

aproximadamente 183 en 2011 a 103 en la actualidad, lo que representa una caída cercana al 45%.

Históricamente, la comuna de La Serena ha concentrado la mayor parte de este cultivo, superando el 60% de la superficie regional. Actualmente, esa proporción se mantiene relativamente estable, con cerca de 56 hectáreas en la comuna, equivalentes a entre un 56% y un 60% del total regional. En tanto, la comuna de Canela se posicio-

CARTELERA

CINEMARK™

Mallplaza La Serena, Alberto Solari 1400



Escanea el código para
revisar la cartelera