

Fecha: 10-05-2026
Medio: El Labrador
Supl. : El Labrador
Tipo: Noticia general
Título: 39 casos de hantavirus en lo que va del 2026 en Chile: aumento de la letalidad

Pág. : 7
Cm2: 89,0
VPE: \$ 133.504

Tiraje: 2.000
Lectoría: 6.000
Favorabilidad: ☐ No Definida

39 casos de hantavirus en lo que va del 2026 en Chile: aumento de la letalidad

Por Johnny Ahumada Sepúlveda

Al final del mundo, en Chile, donde el hantavirus es endémico, ha confirmado al menos 39 casos de esta enfermedad en lo que va del año y que tiene a 13 fallecidos, lo que caracteriza su letalidad del 33% y supone un aumento de esta tasa con respecto a años anteriores, informó el Ministerio de Salud a la agencia EFE.

La mayoría de los contagios se han registrado en 9 de las 16 regiones del país, en la zona central y austral: Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

En el año 2025, se contabilizaron un total de 44 casos y ocho fallecidos a causa de la enfermedad, lo que arroja una tasa de letalidad del 18%, de acuerdo al ministerio.

Otros epidemiológicos públicos, entre 2020 y 2024 se han registrado entre 30 y 70 casos anuales en Chile, con una letalidad del 26% en este periodo de cinco años.

"La mayor letalidad (de 2026) podría relacionarse con factores propios de los pacientes y la oportunidad en el diagnóstico, lo que refuerza la importancia de consultar a tiempo ante cualquier síntoma compatible", indicó la cartera en una declaración enviada a EFE.

Sin embargo, la Variante Andes, una de las más peligrosas y la única que puede transmitirse de persona a persona, es la predominante en Chile y Argentina, desde donde partió el pasado 1 de abril el crucero MH Hondius en él, que se ha registrado un brote de hantavirus, con ocho y tres fallecidos.

El virus, puede causar complicaciones cardiorrespiratorias graves, es transmitido por el ratón cola larga, una especie que habita principalmente en los bosques húmedos del sur de Argentina y Argentina.

Preocupante, la materia de los casos en Chile, que suelen registrarse durante el verano, sucede por transmisión directa entre el animal y la persona a través de la inhalación de partículas virales provenientes de las heces, orina y saliva de los roedores.