

Fecha: 26-04-2025
 Medio: La Estrella de Concepción
 Supl.: La Estrella de Concepción
 Tipo: Noticia general
 Título: Encuesta revela las principales formas de contagio de hepatitis A

Pág.: 6
 Cm2: 254,2
 VPE: \$ 348.737

Tiraje: 11.200
 Lectoría: 46.615
 Favorabilidad: ☐ No Definida



ESTUDIOS REALIZADOS POR PERSONAL SANITARIO EN EL BIOBÍO.

Encuesta revela las principales formas de contagio de hepatitis A

La Seremide Salud del Biobío, a través del Departamento de Epidemiología, realizó una encuesta de investigación que fue aplicada por lugar de residencia a 103 personas contagiadas por la hepatitis A, dando como resultado que los principales factores de riesgo identificados por los encuestados corresponden a ingesta de alimentos adquiridos en la vía pública (56,3%) y consumo de mariscos crudos (55,3%). El sondeo arrojó, además, como otras conductas de riesgo, el no lavarse las manos al llegar al domicilio (23,3%) y no lavar frutas (22,3%).

“Frente al aumento de casos de hepatitis A en la región, hemos realizado una revisión de los casos notificados, a los que se le aplicó una encuesta con el objetivo de detectar cuáles serían los factores

de riesgo involucrados en el contagio. La entrevista aplicada a 103 casos, concluyó que las principales conductas de riesgo para la infección serían el consumo de mariscos crudos y la ingesta de alimentos comprados en la vía pública”, señaló el seremi de Salud, Eduardo Barra.

La hepatitis A constituye una inflamación al hígado, que se propaga cuando una persona no infectada y no vacunada ingiere agua o alimentos contaminados por heces de una persona infectada, lo que se debe fundamentalmente a condiciones de saneamiento precario o faltas de higiene. La infección se materializa cuando las manos de la persona encargada de cocinar están sucias, así como por el contacto de alimentos con aguas residuales o insuficientemente tratadas. ☺